


PROCESSUS INTEGRI
1486.n.3.

I N

M O



C U R A

A THOMA SYDENHAM, M. D.

CONSCRIPTI.

Quibus accessit graphica Symptomatum delineatio,
unà cum quamplurimis observatu dignis.

NEC NON

De PHTHISI Tractatulo.

EDINBURGI:

Apud HAMILTON, BALFOUR, & NEILL.
MDCCL.



L E C T O R I.

AMICE LECTOR,

SPECIMEN habes Praxeos eximiæ,
in dilectissimi filii M. D. usum,
cauté & diligenter excogitatum, suâ
ipsius manu conscriptum; mihi autem
pro familiaritate istâ quâ omnes excepit
concessum à *Cl. Sydenhamo*; viro sanè,
cui vix ætas superior parem dederat,
vel postera datura est, non modò in
arte suâ mirâ sagacitate, & ingenij acu-
mine singulari, conspicuo; sed & pro-
bis moribus, & in humanum genus stu-
dio & amore insignibus adeò, ut apud
omnes summum sui reliquerit deside-
rium: cujus præcepta, licet animo meo

& imo pectore infixæ sint, ne tamen fortè fortunâ, in mei ipsius & ægrorum detrimentum, excidant memoriâ parùm fidâ, typis haud ita pridem mandabam, exemplaribus circiter viginti impressis, ut amicis quoque infervirem. Nescio autem quo pacto in lucem irrepsit publicam inter *Miscellanea Curiosa* superioris anni Norimbergæ editum; sed ineptâ mole inutile. Prodiit tandem eo modo vestitum, ut tibi sit in quovis loco paratum; figmentis cerebri vanis, & futilibus sciolorum dogmatis nequaquam refertum; nec hypothefi placidâ solidis, ut videtur, rationum momentis undequaque constipatâ superbiens; humile autem & modestum accuratè morbos depingit, & accuratiùs adhuc medetur; in id solum sollicitum, ut innotescat quod natura faciat aut ferat. Et si verum loqui liceat, modò partium situs noveris, pateant tibi per Symptomata ægri-

ægritudines, (quod assiduâ ediscas observatione), scias deinde veram & genuinam medendi methodum per Diætâ & Pharmaciam adhibere, sælicissimus eris practicus, & tibi & infirmis optimè consules. Parùm interim tuâ refert utrum Alkali peccet an Acidum, num in Spiritibus animalibus, an in ipso sanguine, aut in recondito aliquo Viscere delitescat morbi minera; unde de Periodico intermittentium reditu doctè fatis & prolixè possis differere; dum interea ipsa Febris, sine ullis ambagibus, inquietudine, siti, calore, pulsu celeri, nausæâ, cæterisque Symptomatis, etiam astantibus palam est, & apertè dignoscitur. Hinc sæpius mirari subit, quamobrem anxie ita & scrupulosè immediatas & proximas morborum causas, dum Medicinam pertractandam suscipiunt, indagare satagunt, & è tenebris istis quibus natura obduxit,

irrito

irrito licet conatu, eruere, gravi & sub-
acto judicio viri & in praxi versatissi-
mi; satis interim gnari se latere vel
quævis obvia. Unde enim dimanat
graminis viridis, aut albus nivis color?
Quid est quod humana anima ratioci-
nari nequeat dum adhuc Infantes aut
Pueri fumus? Unde forma tua specifi-
ca? Satius esset Medicum quàm Philo-
sophum agere (quis enim unquam Car-
tesium sibi Medicum voluerit?) minu-
tissima Phænomena planè & ritè enu-
merare, & remedia, quibus unusquisque
morbus faciliùs cedat, candido & sin-
cero animo proponere; ita tandem li-
mites suos prætergressa, quibus angustis
nimis jam includitur ars nobilissima,
omnibus, quaquaversum patet orbis,
fæliciter satis & prosperè salutem, filiis
autem suis honores summos conciliabit.

Meditabatur, paulò ante obitum, tra-
ctatum de Phthisi peritissimus Medicus;

in

in perquirendo naturæ methodum, quâ morbos amoliri studet, ut adjutrices porrigeret manus, & miseris hominum subveniret, diu noctuque pensitabundo, & anxio animo, exercitatissimus: hinc fidissimarum observationum serie & irrefragabili edoctus experienciâ, medicinæ praxin ornavit, & ad faniores reduxit regulas. Sed, væ tabidis, dum hujusmodi nunquam intermissis studiis detenti & defatigati spiritus, solitis non vacabant excubiis, truculentissimus hostis, *Pedagra*, quæ per multos annos obsederat, & debilitaverat artus; impetu facto in interiora viscera irruit, per vomitum & secessum enormiores intantans mortem: Unico autem morbo nescit cedere Medicorum Princeps; sed cum malorum cumulo accessit & *Renum Calculus*, qui corrasis vasorum osculis, sanguinem liberaliùs, quàm senectus tulit, urinæ permixtum effudit; se jam
non

non ampliùs opponens, nec vitæ, nec mortis cupidus, placidam, & pacatam, expiravit animam. Ne tamen auxilio prorsùs destituantur tabidi, fragmenta quædam, quæ auctorem ubivis sapiunt, in primo saltem morbi stadio plerumque proficua, (neque enim fas est, quod ægrotanti proximo opituletur, celare), in publicum prodeunt; ut exindè pateat quam accurata, & omnibus numeris absoluta, si modo Deus Optimus Maximus concessisset vitam, expectari potuisset Phthisiologia.

Quid in Febribus, Variolis, Morbillis, acutis cæteris ut & Chronicis, sanandis valuit optimè meritis auctor noster, sequentes indicant paginæ. Regimen & Diæta instituuntur aptissima; præscribuntur remedia pauca, sed necessaria; nec in Pharmacopolarum lucrum exco-gitata, nec inani ostentationi composita: sitibundis ægris (eodem modo quo & ipse

ipse sitim suam restinguere solitus erat)
cerevisiam tenuem affatim & pro libitu
hauriendam, unde mirè reficiuntur &
refrigerantur, concedit; nec immani-
tate plùs quàm barbarâ, precibus eorum
surdus, Apozemata & Julapia præ in-
grato sapore fastidita substituit; maxi-
mam adhibet cautelam, ne exæstuans ni-
mis, vel igne luculentiori, vel stragulo-
rum onere, plùs adhuc incalesceret, vel
à propinatis forsan remediis eum in fi-
nem, ut per poros eliminetur materia
morbifica cruda adhuc & inconcocta;
quæ tamen hâc datâ ansâ concitato mo-
tu cerebrum petit, unde Phrenesis aut
Coma, extravasato sanguine detarpan-
t cutim maculæ purpureæ, aut eruptiones
quas vocant miliares, collum & pectus
ubivis obsident. Numquid ad amussim
magis depingi poterat quàm Variola-
rum historia? eruptionis diem in utra-
vis specie designat, pustularum ingeni-
um,

um ad unguem describit; quo tempore incipiat, & quamdiu continetur Salivatio; quo iterum faciei manuumque tumor se prœdat; quid tandem quolibet die expectandum, disertè explicat. Pæregoricorum usum, quo emolumento judicent Practici, primus persuasit, malum, ingerendi Cardiaca ante eruptionem, morem, unde sæpè accersitum fuerit confluentium genus, meritò primus improbavit. Meliùs autem hæc ex ipso fonte. Valeas itaque, amice Lector, & sicubi scateant Mendæ ignoscas.

S, M.

EXCEL-

E X C E L L E N T I

ET IN RE MEDICA ADMIRABILI VIRO

D. THOMAE SYDENHAM, M. D.

O Qui capacem nobilis artifex
 Eludis Orcum ; quo tamen ibimus
 Cuncti, quo humanæ Parentes
 Et decimæ tulit ordo Lunæ ;
 Præsens fugacem sistere Spiritum,
 Præsens maligno tollere de toro
 Mortale Corpus, & propinquum
 Exequiis remove Morbum :
 Quem Nos honorem, quas statuas Tibi
 Ponemus, O cui non alium parem
 In arte Phœbus, se remoto,
 Aut Oriens videt aut recumbens ?
 Quo Febris audax cumque movet pedem,
 Te Mater omnis, Te lachrymabilis
 Adcurrit Uxor, ne caducum
 Orba virum puerosque ploret.
 Seu Confluentes forte timet notas
 Decora Virgo ; Tu faciem eripis
 Periclitantem protegisque,
 Perniciem juvenum futuram.
 Atqui odit artes & Tua pocula
 Hæres profusus, quem simul extulit
 Ad spem implicatus vel Febrili
 Igne Pater, vel Hydropis Unda.
 Mire paratam, Te Medico, Senex
 Protelat Urnam, non sine gloria
 Phœbi Tuaque, qui fugasti
 Pollicitum sibi magna morbum.
 Sic Te scientem non faciunt Libri
 Et Dogma pulchrum ; sed Sapia
 Enata rebus, mensque facti
 Experiens, animusque felix.

Non

Non mille Plantæ & multa domi Vitra,
 Ignisque Centum, aut Hypothesis placens
 Profunt Medenti, vel coercent
 Sæva Luis mala, sæva Febris;
 Ni pectus adsit concilii potens;
 Ni plena rugis Experientia
 Ususque naturam secutus,
 Quid faceret moneant in aurem.
 Hæc Praxis olim grande decus Sacra
 Adduxit Arti: Sic Veterum stetit
 Secura fama; sic prævit
 Hippocrates, meruitque Cælum.
 At non eandem forte pari viam
 Pressit Galenus: Non Arabes Virum
 Æque sequuti; non Falerna
 Usque madens Paracelsus uva.
 Primus relictæ Tu genium adseris
 Fidemque normæ: En Diva Tibi Salus
 Applaudit & ridens Juventus,
 Vitaque non metuens Sepulchri,
 Ex quo vagantem scripta manu Tua
 Correxist Orbem Pagina nobilis:
 Longum Illa Morbosis, Tibique
 Perpetuum patefecit ævum.
 Jam si qua restant, Eja frequentibus
 Concede votis; Nos Juvenilium
 Vulgus Medentum, Nos avara
 Qualibet excipiemus aure.
 Forte & futuro tempore quispiam
 Poëta, Musis carior, ætheri
 Te sidus addet, Te salubre
 Sidus, & in Crisibus benignum.
 Me destinantem talia Chemicæ
 Curæ repossunt: Me Medicus labor
 Et spes locatæ non vacare
 Pieriis patiuntur undis.

ED. HANNES.

Ex Æde Christi, Oxf.

*Medicamentorum quædam formulæ
in praxi magis familiares.*

Potio Communis Purgativa.

R. **T** Amarind. semunc. fol. Sennæ drachm.
duas, Rhei sesquidrachm. coq. f. q. aq.
ad unc. tres, in Colatura dissolve Mannæ & Syrup.
Rosar. solut. ana unc. unam. Misce, fiat Potio.

Emeticum Commune.

R. Aq. Cardui Benedict. unc. duas, Infus. Croc.
Metal. unc. unam, Syr. Caryophyll. semunc. Misce,
fiat Vomitorium. Sumat horâ quartâ pomeridianâ,
superbibendo post singulas vomitiones haustum
largum liquoris possetici.

Julapium Perlatum.

R. Aq. Cerasor. nigr. Lact. Alexeter. ana unc.
tres, aq. Cinnamom. bordeat. unc. unam, Margarit.
præparat. sesquidrachm. Sacchar. chrysell. q. f. adde
aq. Rosar. Damascen. semidrachm. Fiat Julap.
de quo capiat cochlear. quatuor, vel quinque,
in languoribus.

Julapium Cardiacum.

R. Aq. Lact. Alexeter. Cerasor. nigr. ana unc.

A

tres,

tres, aq. Epidem. Syr. Caryophyll. & de succo Citri,
ana semunc. Misce, fiat Julap. de quo capiat sæpius.

Decoctum Diæticum.

R. Rad. Sarsaparill. unc. sex, lign. Sassafr.
& Chinæ ana unc. duas, Glycyrrhiz. unc. unam.
Coq. in aq. font. Cengis duobus per horæ dimidium;
deinde stent clausè super cineres calidos per horas
duodecim; postea ebulliant ad tertiæ partis consum-
ptionem: Cum primum ab igne amoveatur, infunde
sem. Anisi semunc. post duas horas coletur, & po-
stea depuretur per residentiam, & liquor reponatur
lagenis vitreis probè clausis ad usum. Sit pro po-
tu ordinario per triginta dies.

Apozema Aperiens & Antiscorbuticum.

R. Rad. gramin. Cicher. Fenicul. & Asparag.
ana unc. unam, uvarum Corinthiac. & Passul. enu-
cleat. ana unc. duas, fol. hepatic. ling. cerv. & cap.
Ven. ana manipulum unum, fol. Baccaburg. sub fi-
nem addit. manipulos duos. Coq. s. q. aq. fontan. ad
libr. duas; sub finem adde vini Rhenani semilibr.
Colaturâ adhuc calente, infunde ad duas horas,
vase clauso, Cochl. hortens. manipulum unum. Cola-
turæ adde Syr. è quinque radic. & de succo Auranti-
ana unc. duas, aq. Cinnaom. bordeat. unc. unam.
Misce, fiat Apozema. Sumat semilibr. manè, &
quintâ pomeridianâ, per quatuordecim dies.

A
Eclegma

Eclegma incrassans in Tussi.

R. Ol. Amygd. dulc. unc. unam; Syr. Papav. Rha-
d. Portulac. Jujub. & Loboch. sani ana semunc.
achar. crystall. q. s. Miscè in mortario marmo-
reo ad integræ horæ spatium; & fiat Linctus per-
fectè mistus; recondatur in olla figulina ad usum.
Capiat sæpius lambendo è baculo Liquiritiæ.

Eclegma fortius incrassans.

R. Conserv. Ros. rub. Syr. Violar. & de Mecon.
ana unc. unam, sem. Papav. alb. drachm. tres. Con-
fundantur simul, & per setaceum trajiciantur; deinde
adde ol. Nuc. moschat. express. gr. sex. Fiat Eclegma.

In Defluxione tenui.

R. Conserv. Ros. rub. unc. duas, Syr. de Mecon.
& Jujub. ana unc. unam; Oliban. Mastich. & Suc-
cin. ana drachm. unam; ol. Nuc. moschat. per expres-
sionem gr. sex. Misce, fiat Loboch: de quo lambat
sæpè; bis in die cap. Eclegm. descript. cochl.
unum, instillando Balsam. Sulphur. Anisat. à gut.
octo ad gut. duodecim.

Cerevisia Purgativa.

R. Polypod. Querc. libr. unam, Rad. Rhabarb.
Monach. fol. Sennæ & Passul. enucleat. ana semilibr.
Rhabarb. incis. & rad. Raphan. Rustican. ana unc.
tres, fol. Cochl. hortens. salu. ana manipulos quatuor,

*Aurantior. incis. N^o quatuor. Infunde in Congiis
quinque vel sex Cerevisiæ non lupulata, fermenta-
tionis tempore; Et quando ad maturitatem perven-
erit, sit pro potu ordinatio per dies quatuordecim
vel viginti & unum: præcipuè veròumat hau-
stum singulis Auroris.*

Emplastrum Hystericum.

*R. Galbani in tinctura Castor. solut. Et co-
lat. drachm. tres, Tacamahac. drachm. duas. Fiat
Emplast. pro umbilico.*

Catharticum pro Infantibus tenellis.

*R. Syrup. Cichor. cum Rhabarb. cochl. unum
parvulum.*

Decoctum Amarum Purgativum.

*R. Decoct. amar. duplicatâ Sennâ unc. quatuor,
Syrup. de Spina cervina unc. unam, Elect. de Succ.
Rosar. drachm. duas. Misce, fiat Potio.*

Laudanum Liquidum Auctoris.

*R. Vini Hispanici libr. unam, Opii unc. duas, Croci
unc. unam, pulv. Cinnamomi, Et Garyophyllorum, ana
drachm. unam. Infundantur simul in B. M. per duos
vel tres dies, donec liquor debitam consistentiam ac-
quirat. Colatura servetur pro usu.*

D E
A F F E C T I O N E

I N

Fæminis HYSTERICA, *maribus* HY-
POCHONDRIACA *dictâ.*

CUM a casu aliquo graviore molestum patitur humana anima, ataxiam concipiunt animales spiritus; urina subinde limpidissima copiosè excernitur; sanitatis recuperandæ spes omnis protinùs abjicitur, et tristissima quævis sibi ominantur ægotæ; quamcunque corporis partem morbus infiderit (plurimas autem infidet) symptomata ei parti competentia confestim urgent: in capite apoplexiâ, hemiplegiâ soluta, statim à partu adoritur; spasmi epilepsiæ per similes (vulgò uteri strangulatus, in quo venter & præcordia guttur versùs intumescunt) infestant; clavus hystericus, in quo dolor in capite atrocissimus, quem transversò pollice possis contegere, ægrâ interim materiam viridem bili porraceæ parem evomente, miserè excruciat; cordis palpitationem, tussim, passiones iliacam & colicam, nephritin, urinæ suppressionem

suppressionem, æmulatur paroxysmus; vomitiones enormes, diarrhœam subindè excitat; externè in carne musculosa nunc dolorem, nunc tumorem inducit, in tibiis hydropis instat; nec (quod mireris) intactos dimittit dentes; dolor dorsi creberrimè sævit; & sæpè sæpius adeò refrigerantur externæ partes, ut cadaver planè referant; in risum & lacrymas effusissimas sine ulla *προσδοει* ridiculè erumpunt; ptyalismus nonnunquam eo gradu laborantes afficit, ut Mercurio delibutas facile crederes. Dolores hysterici, quamcunque partem obsident, ubi discefferint, teneritudinem, quæ tangi recusat, relinquunt, ac si verberatæ fuissent carnes.

Mittatur Sanguis ad unc. octo.

Emplast. de Galbano umbilico admoveatur. Sequenti manè aggrediatur usum sequentium pilularum:

R. *Pil. Coch. maj. drachm. duas, Castor. pulv. gr. duo, Balsam. Peruv. gutt. tres. Fiat Pil. duodecim.* Capiat quatuor singulis vel alternis matutinis, pro ratione virium, horâ quartâ vel quintâ matutinâ, superdormiendo.

R. *Aq. Rutæ unc. quatuor, Bryon. comp. unc. duas, Castor. nodulo ligat. & in vitro suspens. semi-drachm. Sacchar. crystall. q. s. Fiat Julap. de*
quo

quo capiat cochl. quatuor vel quinque in omni languore.

Post has pilulas sumptas, utatur sequentibus:

R. *Limatur. Chalyb. gr. octo, cum s. q. Extract. Absinth. Fiat Pil. N^o tres.* Sumat summo manè, & repetantur horâ quintâ pomeridianâ per triginta dies, superbibendo haustum vini Absinthitis.

Sin forma boli magis arrideat,

R. *Conserv. Absinth. Roman. & Conserv. flaved. Aurant. ana unc. unam, Angelic. condit. Nuc. moschat. condit. & Theriach. Andromach. ana semunc. pulv. Ari comp. drachm. tres, Zinzib. condit. drachm. duas, cum s. q. Syrup. de succ. Citr. vel, ejus defectu, Syr. Aurantior. Fiat Electuagrium.*

R. *Elect. præscript. drachm. duas, Limatur. Chalyb. gr. octo, cum s. q. Syrup. Aurantior. Fiat Bolus, sumendus manè & serò, superbibendo haustum vini Absinthitis; vel cochl. sex seq. Infusionis.*

R. *Rad. Angelic. Enul. Campan. & Imperator. ana unc. unam, fel. Absinth. vulg. Centaur. min. Marrub. alb. & Chamædr. ana manipulum unum, Cort. Aurant. duor. incis. affunde vini. Hispanic.*

Hispanic. q. s. ad supereminentiam duorum digitorum.
Coletur tempore usus. Vel,

In Delicatulis *Chalybs* exhiberi poterit in forma pulv. sequentis :

R. *Limatur. Chalyb. probè trit. unc. unam,*
pulv. Ari comp. drachm. sex, sem. Coriand. præ-
parat. Anisi, Fœnicul. dulc. ana semunc. Cinna-
mom. accutiss. Corall. rubr. præparat. ana drachm.
tres, Nuc. moschat. drachm. duas. Fiat omnium pul-
vis subtilissimus; cui adde Sacchar. albiss. ad pondus
omnium. Hujus cap. è cochleari semidrachm.
bis in die per quatuor dies, tum drachm. unam
bis in die per quadraginta dies, superbibendo
cochl. sex seq. Julap. vel vini Absinthitis.

R. *Aq. Lact. Alexeter. uncias duodecim,*
Gentian. comp. unc. quatuor, Absinth. magis comp.
unc. duas, Sacchar. albiss. q. s. Fiat Julap. Vel,

R. *Vini Rhenan. Absinth. semilibr. aq. Gentian.*
comp. unc. duas, Syr. Caryophyll. unc. unam. Fiat
Julap.

R. *Myrrh. elect. Galban. & Assæ fatidæ,*
ana drachm. unam, Castor. semidrachm. cum s. q.
Balsam. Peruv. Fiat Pil. è singulis drachmis duo-
decim. Sumat tres singulis noctibus, superbi-
bendo

bendo *aq. Bryon compos. cochl.* tria vel quatuor per totum decursum hujus processus,

Si *Pilulæ præscriptæ* ventrem moverint, utatur sequentibus :

R. Castor. drachm. unam. Sal. succin. volatil. semidrachm. cum s. q. extract. Rutæ. Fiant Pilulæ N° viginti et quatuor. Capiat tres singulis noctibus, superbibendo Julapii hysteric. cochl. tria vel quatuor.

Sp. Cor. Cervi ad gutt. sedecim, vel octodecim, in aqua aliqua appropriata sæpiùs exhibitus, valde confert.

Si verò his non cedat remediis, tum capiat sequentes pilulas :

R. Trochisc. de Myrrh. pulv. scrup. unum, Balsam. sulphur. Terebinth. gutt. quatuor, cum s. q. gum. Ammoniac. solut. Fiant Pil. N° quatuor. Capiat manè et serò, superbib. Julap. hysteric. cochl. quatuor vel quinque, instillando Sp. Cor Cervi gutt. duodecim.

Elektuarium Antiscorbutic. cum aqua ibidem descripta prodest in his affectionibus, ut et Elektuar. corroborans, cum additione Conserv. Cochl. bortenf. unciam unam, pulv. Ari. compos. drachm. sex, superbibendo præscriptam aquam.

At si affectus his non cedat remediis, eundem est ad *aquas ferreas*; et si neque his, tum ad *Sulphureas*, quales sunt *Bathonienses*.

Inter bibendum *aquas ferreas* hæc observanda: si aliquod Symptoma gravius acciderit, quod potationi *aquarum* referri potest, tunc ab iis æger abstineat, donec Symptoma istud penitus evanuerit. Æger in earum usu per sex septimanas ad minimum, vel potius ad duos menses perseveret. *Zinziber conditum*, vel *Semina Carui Saccharata*, ad calefaciendum ventriculum subindè sumat. *Pilulæ* etiam *hystericæ* tres devorari possunt per primas decem noctes, superbibendo *Julap. hysteric. cochl.* quatuor vel quinque.

Quoad usum *aquarum Bathoniensium*, duobus diebus bibat eas, ac tertio die per modum Balnei eas ingrediatur; atque ita alternatim per sex septimanas, vel duos menses.

Si *Chalybs* justo plùs corpus calefaciat, tum per ejus usum quartâ quâque Aurorâ sumat *aq. mineralium purgantium* libr. quatuor. Quæ tamen alvum moveant, haud tamen tumultum cient, ut solent Carthartica ex officinis deprompta.

Si *Chalybs* magnas perturbationes inducat, *Laudanum aq.* aliquâ *hystericâ* mistum, singulis noctibus ad tempus aliquod propinandum.

Cùm

Cùm à morbi diuturnitate fractæ et attritæ fuerint vires, venæsectio, et cathartica non sunt præmittenda, sed à Chalybe statim incipiendum.

Ubi symptomata sunt mitiora, fatis est sanguinem mittere, et alvum solvere ad dies tres vel quatuor; dein *Pilulas hystericas* ad dies decem, manè et serò exhibere.

In dolore intolerabili, vomitione, et diarrhæa enormioribus, exhibendum *Laudanum* et postea corroborandi spiritus; at modo per vires liceat, antè usum Laudani, educatur è venis sanguis, et *catharticum* propinetur; in viraginibus præsertim et sanguineo temperamento præditis: in debilioribus autem, et haud ita pridem paroxysmum passis, sufficit ventriculum congio uno lactis cerevisiati hausto, et mox per vomitum rejecto detergere; dein largam dosin *The-riac. Androm.* vel *Elect. Orvietan.* imperare, et cochl. aliquot liquoris alicujus spirituosi, cum pauculis *Laudani liquid.* guttulis, superbibenda, dare. Quòd si ægra jampridem vomuerit, et ulteriùs emeticis sollicitare periculo vacabit, *Laudanum* sinè mora propinandum est, eâ dosi, quæ Symptoma vincat, et post singulas vomitiones toties quoties repetendum, in forma potissimum solida, vel in liquida, in parco vehiculo, viz. gutt. aliquot in cochl. unum aq. *Cinamom.*

fortior. ægrâ interim conquiescente, et caput immotum tenente.

Perdomito Symptomate, manè et serò, ad dies pauculos continuetur usus *Laudani*.

Hæc duo diligenter notanda: quòd cum semel post evacuationes Laudano uti cœperimus, eâ dosi, atque illâ toties repetitâ, sumendum est donec Symptoma omninò fuerit debellatum, interjecto tantùm spatio inter singulas doses, ut quid prior præstiterit ante noscamus quàm alteram ingeramus; deinceps cum Laudano morbum aggredimur, nihil movendum est, nihil evacuandum vel per mitissimum enema.

Theriaca Andromachi crebrò, diuque usurpata, magnum est in hoc, et aliis morbis quàm plurimis a coloris, et concoctionis defectu ortis, remedium.

Vina Hispanica Gentianâ, Angelicâ, Absinthio, Centaury, Corticum Aurantium flavedine, aliisque corroborantibus infusus medicata, si aliquot cochlearea ter in die potentur, admodum conferunt; modo ægra tenui non fuerit biliosoque corporis habitu.

Cortex. Peruv. ad scrup. unum manè et serò, per septimanas aliquot deglutitus, præsertim in spasmodicis hysterice miras habet vires.

In tenui biliosoque corporis habitu possit usurpari *Diatæ lactea*, præcipuè in Colica hysterica,
 si

Si modò ea incommoda possint superari, quæ primis fere diebus apportat; quod nempè tum in ventriculo coaguletur, tum etiam viribus corporis, in statu conservandis, sustentandisque minùs sufficiat.

Nihil tamen æque sanguinem spiritusque fovet et confirmat, ac diu multumque singulis ferè diebus equo vehi; nec itinera in curru facta suo carent successu.

De Febre Depuratoria annorum 1661, 62, 63, 64.

SI æger Juvenis sit, extrahatur sanguis è brachio; et eodem die post aliquot horas, vel sequente die, duabus horis post leve prandium, *Emeticum ex infus. Croc. Metal. (paratis Zytbogal. libr. sex vel octo, ut quoties vomuerit, aut alvum exoneraverit, è vestigio sumatur haustus)* exhibeatur; et post finitam operationem *Emetici*, hoc vel simile paregoricum:

R. Aq. Cerasor. nigr. fescunc. aq. Epidem. semunc. Laudan. liquid. gutt. sedecim, Syr. Caryophyll. drachm. duas. Misce, fiat Haustus.

Vomitoria ex infus. *Croc. Metall.* parata puerulis, ullisve infra adolescentiam constitutis, vel minimâ quantitate, non est tutum exhibere.

Post hunc diem usque ad undecimum vel duodecimum

decimum singulis auroris injiciatur Enema sequens :

R. *Decoct. commun. pro Clystere libr. unam (vel lactis vaccini eandem quantitatem) Sacchar. culinar. & Syrup. violac. ana unc. duas. Fiat Enema.*

Post dictum diem alvus constipari permittatur, quo materia febrilis citius concoquatur, ad quem etiam finem Cardiaca moderata, his ultimis diebus exhibita, apprimè conducunt ; ut,

R. *Pulv. è chel. Cancror. comp. gr. quatuordecim, Elect. de Ovo semisrup. cum f. q. Syr. Caryophyll. Fiat Bolus, fumendus octavâ quâque horâ, superbibendo sequentis Julapii cochl. quinque vel sex.*

R. *Aq. Lact. Alexeter. Cerasor. nigr. ana unc. tres, aq. Epidem. & Syr. Caryophyll. ana unc. unam. Misce, fiat Julap. vel alia his similia.*

Hac methodo sollicitè observatâ, usitatò circa quindecimum diem (tum ex laudabili in urina separatione, tum ex manifesta Symptomatum omnium remissione) tempestivum esse Potionem Purgantem communem exhibere percipies.

Accidit interdum, maximè in Senibus, curatâ Febre, & purgato corpore, ægrum nihilominus valde debilem esse, & quandoque tussi, interdum etiam

etiam screatu, magnam glutinosi viscosique, phlegmatis copiam expectorare. Hoc in casu vinum Malaganum annosum, cum pane tosto ei immisso, bibat æger.

Si superveniat Iliaca passio, præscribatur *Sal. Absinth. scrup. unum, ex cochl. uno, Suc. Limonium, manè & sero*; intermediis temporibus capiantur *aq. Mentb. stillatit. sine Saccharo, cochl. aliquot, bis quâque horâ*. Dum hæc fiunt, catulus vivens nudo ventri indefinenter accumbat. Postquam dolor cum vomitu per biduum triduumve cessaverit, exhibeatur *Pil. Coch. maj. in aq. Mentb. soluta, nec removendus catulus ante Pilularum usum*.

Ad recidivam præcavendam, persistat in usu prædictæ aquæ per longum tempus; & duplicatis pannis laneis ventrem à frigore defendat.

De Febre Pestilentiali 1665, 66.

POst venæsectionem in lecto celebrandam, æger stragulis obruatur, & Lacinia lanea fincipiti alligetur; tum, si vomitus non adsit, hoc vel simile Hydroficum exhibe:

R. Theriac. Andromach. semidrachm. Elect. de Ovo scrup. unum, Pulv. è chel. Cancr. comp. gr. duodecim,

duodecim, Coccinel. gr. octo, Croc. gr. quatuor, cum f. q. succ. Kermes. Fiat Bolus; quemumat sextâ quâque horâ, superbibendo cochl. sex seq. Julapii:

R. Aq. Card. Benedict. & Scord. compos. ana unc. quatuor, aq. Theriacal. stillatit. unc. duas, Syr. Caryophyll. unc. unam. Misce, fiat Julap.

Si adsit vomitio, hydropicū differatur, donec solo tegumentorum pondere sudor promanare incipiat, linteaminis parte vultui superinductâ.

Incepta Diaphoresis haustulis Zythogalæ salviâ alteratæ, vel Cerevisiæ, cui macis aliquantulum incoxeris, subinde repetitis, ad naturalis diei spatium (i. e. horas 24.) est continuanda; in sudore licet jusculis confortativis ægrum reficere.

Ubi tumor enatus fuerit, venam aperire non sustinui. Per horas adhuc à finito sudore viginti & quatuor, ægro se in lecto continente frigus cautè devitetur; indusium sponte suâ in corpore arefcere permittatur, potulenta omnia calidiusculè hauriantur, & Zythogalæ salviâ alteratæ usus etiamnum continuetur. In seq. luce *potio purgat. communis* exhibeatur,

Anni 1667, 1668, Febrim Variolosam & Variolas produxerunt.

Anni 1669, 70, 71, 72, Febrim Dysentericam.

Anni

Anni 1673, 74, 75, Febrim Comatosam,
Curationem Februm horum annorum non at-
tingo; quoniam methodo in febre anni 1685,
&c. descriptâ curari eas potuisse autumo.

De Febris Intermittentibus.

CUM rigore & horrore adoritur paroxysmus,
quibus mox succedit calor, & hinc tandem
sudor, & subsequens ἀπυρεξία: licet in primis
morbi diebus, Autumno maximè, aliquoties re-
missio potius quàm intermissio persentiscitur. In
calore æque ac in rigore vomitur ut plurimum
ac vehementer, ægrotat miser, cum siti et lingua
arida. In tenera ætate abdominis inflatio, in ad-
ultis crurum tumor febris solutionem; tonsilla-
rum dolor, rauco, oculi cavi, facies Hippocra-
tica, mortem denunciat.

R. Cort. Peruv. subtiliss. pulv. unc. unam, cum
s. q. Syr. Caryophyll. vel de Rosis siccis. Fiat Electu-
arium, dividendum in duodecim doses; quarum un-
am capiat quartâ quâque horâ, superbibendo
Vini cujuslibet haustum, incipiendo immediate
post paroxysmum.

Si autem præscripti boli ventrem moverint,
in haustu Vini dentur gutt. decem Laudan. liquid.

C

singulis

singulis vel alternis vicibus post assumptionem boli, ut opus fuerit.

Ad recidivam præcavendam (præcipue in Quartana) repetatur processus prædictus singulis septimanis per tres alias vices.

Sin forma Pilularum magis arrideat,

R. Cort. Peruv. pulv. unc. unam, cum f. q. Syr. Caryophyll. Fiant Pilulæ mediocris magnitudinis; quarum capiat sex quartâ quâque horâ.

R. Cort. Peruv. pulv. unc. duas, Vin. Rbenan. libr. duas; stent simul in infusione frigida, & coletur per manicam Hippocratis. Usûs tempore capi-
antur unc. tres, tertiâ vel quartâ quâque horâ.

Sin ob vomituritionem, ferè continuam, Corticem deglutire nequeat æger, tum sexies, vel octies, spatio duarum horarum, Succi Limonum recens expressi cochl. unum, cum Salis Absinth. scrup. unum assumat; dein Laudan. liquid. gutt. sedecim, cum aq. Cinnam. fortior. cochl. unum; ac brevi post, cessante vomitu, Cortices usum aggrediatur.

In intermittentibus Vernalibus, nonnunquam emeticum, tempestivè propinatum, ut nempe ante paroxysmum negotio suo defungi possit, felicissime successit. Nonnunquam Enema in diebus intermittentibus, per triduum vel quatrimum injectum,

injectum, curationem absolvit. Quæ sequenti quoque modo tentari potest.

R. *Serpentar. Virgin. subtiliss. pulverisat. gr. quindecim, Vin. alb. unc. tres.* Sumat duabus horis ante Paroxysmum, & stragulis coopertus æger sudet per tres vel quatuor horas; idem faciendo per duas alias vices ante Paroxysmum.

Si ab ingeminatis Paroxysmis summè debilis fuerit æger :

R. *Conserv. Flor. Borag. Bugloss. ana unc. unam, conserv. Anthos. semunc. cort. Citr. condit. Nuc. moschat. condit. Theriac. Andromach. ana drachm. tres, confectio. Alchermes drachm. duas. Misce, fiat Opiata.* Capiat ad quantitatem avellanæ, manè & vesperi, superbibendo cochlearia paucula alicujus aq. Epidemicæ simplicioris, Saccharo edulcoratæ; interdicto interim enematum usu.

Si sub morbi excitum occurrat Hydrops, nondum tamen depulsâ Febre, curatio non est instituenda remediis purgantibus, sed infusionibus rad. *Raphan. Rustican. Summitat. Absinth. Centaur. min. Baccar. Juniper. cinerum Geniss. &c.* in vino factis: exulante autem Febre, cathartici, & aperientibus.

Pro Infantibus Febre intermittente laborantibus :

R. *Aq. Cerasor. nigr. & vini Rhenan. ana unc. duas, cort. Peruv. subtiliss. pulv. drachm. tres, Syr. caryophyll. unc. unam. Misce, fiat Julap.* Capiat cochl. unum, alterumve, pro ratione ætatis, quartâ quâque horâ, donec Paroxyfmi nom amplius discrutient; instillando alternis vicibus, si Diarrhœa adfuerit, *Laud. liquid. gutt. unam vel duas.*

De Febre Stationaria, ab anno 1685, ad 1690.

CAlor & frigus se invicem excipiunt; artus pariter & caput dolent; pulsus interim fere sanus, nonnunquam tussis, dolor circa collum & fauces, exacerbatio Febris prope noctem; inquietudo, sitis, lingua vel humida, & ex omni parte pelliculâ albâ & scabra vestita, vel ficca, fusci coloris in mediô, quam partem undique cingit fimbria inalbescent. A jugi in lecto decubitu coma & phrenesis; à calido regimine petechiæ, maculæ purpureæ, eruptiones (quas vocant) miliares morbillis magis rubentes, pulsus inordinatus, tendinum subsultus, atque ita tandem mors. Sudores in initio symptomatici divexant,

vexant, qui, si ab arte provocentur, viscosi à capite erumpunt, & materiam morbificam in caput aut in artus transferunt.

Mittatur sanguis ad unc. decem è brachio. Reiteretur Venæsectio, si modò respirationis difficultas, dolor capitis inter tussendum lancinans, & alia signa Peripneumoniæ nothæ adsint. In hoc casu tam Venæsectio quàm Catharsis repetenda, donec æger convalescat.

Vesperi applicetur Epispasticum, & sequenti aurorâ Potio Lenitiva præscribatur; quæ ad tertiam vicem alternis diebus repetatur; & horâ somni post Catharsin haustus pacificus propinetur.

R. *Aq. Paralyf. unc. tres, Syr. de Mecon. unc. unam, Succ. Limon. recent. extract. cochl. duo, Misce, fiat Haustus.*

Aphthæ & singultus sponte suâ post curationem febris supervenientes, sponte evanescent. Si in longum tempus decurrant, facillè fugantur *Cortic. Peruv. unc. unâ, cum Syr. Papav. Rbæad. q. s. in formam Electuar. vel Pilular. redactâ, superbibendo haustum lactis deflorati.* Remedium hoc certissimè scopum attingit, si non frustrentur ejus vires, ex jugi ægri in lecto decubitu.

Diebus

Diebus à purgatione liberis sequentia præscribantur :

R. *Conserv. Lujul. & Cynosbat. ana unc. unam, conserv. Berber. semunc. Crem. Tart. drachm. unam, cum s. q. Syr. de Limonib. Fiat Electuarium;* de quo capiat ad magnitud. Nuc. moschat. ter in die, superbibendo sequent. *Julap. cochl. sex.*

R. *Aq. Portulac. Lactuc. Paralys. ana unc. tres, Syr. de Limonib. fescunc. Syr. Violar. unc. unam, Misce, fiat Julapium. Vel,*

R. *Aq. font. libr. unam, aq. Ros. Succ. Limonum, Sacchar. albiss. ana unc. quatuor. Coq. lento inge, dum despumaverint. Capiat unc. tres ad libitum. Præscribatur quoque seq. Gargarisma.*

R. *Succ. Pomor. agrest. semilibr. Syr. de Ruba Ideo unc. unam. Misce, fiat Gargarisma.*

Si febris ita ventriculum infestet, ut æger portionem retinere nequeat, *Pil. Coch. maj. ad scrup. duas* exhibeantur; tum etiam hypnoticum est concedendum, verbi, gratiâ *Laudan. Londin. sesquigr. cum simili quantitate Mastich. vel Laudan. liquid. gutt. octodecim, in aq. Cinnamom. bordeat. unc. unam.*

Decoctum

Decoctum album paratum ex unc. una Cor. Cervi ussi, in aq. communis libr. tribus cocti; & Costea Saccharo albissimo edulcoratum, sit pro potu, ut & Cerevisia tenuis pro libitu.

Post Catharsin bis celebratam, concedatur ægro, pullorum carnibus vesci; & post ultimam Purgationem, modo febris aliquantulum delagraverit, vini Canarini cochl. tria vel quatuor, manè & sero, ut & post prandium, per dies aliquot propinentur.

In Phrenitide, ut & Comate, nihil perinde confert, atque ægri caput radi, nullo admoto Emplastro, sed Piliolo tantum.

Si (quod scæminis Hystericis quandoque accidit) post venæsectionem, & purgationes hujusmodi iteratas, etiamnum duret, procurratque febris, modo signa Peripneumoniæ, & inflammationis circa partes vitales absint, singulis noctibus *Paregoricum*, & medicamenta hysterica, bis vel ter in die, injungantur.

De Infantibus Febre Stationariâ laborantibus.

H Irudines duæ utrinque ponè aures applicentur; dein *Emplastr. Epispasticum* cervici admoveatur.

Cerevisiâ,

Cerevisiâ, quâ Rhabarbarum fuerit infusum, purgetur.

Si post Catharfin febris intermittere videatur, tum *Julapium cum Cortice Peruviano* (in Capite de febre intermittente pro infantibus descriptum) exhibeatur.

De Febre Scarlatina.

Æ State exeunte, infantes præcipuè infestat. Rigent & horrent sub initium; nec tamen admodum ægrotant; cutis universa maculis parvis, rubris, crebrioribus, latioribus, & magis rubentibus quàm in morbillis, interstinguitur. Ad duos trefve dies persistunt; quo quidem tempore evanescunt, & decendente subjectâ cuticulâ squammulis furfuraceis, ad instar farinæ, cutis conspergitur.

R. *Cor. Cervi usti, & pulv. è chel. Cancr. comp. ana semidrachm. Coccinel. gr. duo, Sacchar. crystall. drachm. unam. Misce, fiat pulvis subtiliss. in duodecim Chartulas dividend. quarum unam capiat sextâ quâque horâ, superbibendo cochl. duo vel tria sequentis Julapii.*

R.

R. *Aq. Cerasor. nigr. aq. Lactis Alexeter. ana unc. tres, Syr. è succ. Citri unc. unam. Misce, fiat Julap.*

Applicetur etiam Epispasticum cervici, & qualibet nocte *paregoricum ex Syr. de Mecon.* propinetur; & postquam symptomata cessaverint, purgetur æger.

De Pleuritide.

INter Ver et Æstatem dominatur. A rigore et horrore orditur; quos statim comitantur calor, sitis, inquietudo, et cætera febrium symptomata; elapsis pauculis horis, æger vehementi dolore puncturio in laterum alterutro circa costas corripitur, qui nunc versùs omoplatas, nunc spinam, nunc anteriora pectoris sese propagat; tussi crebrâ excruciat. Materia spuito rejecta in initio morbi pauca est et tenuis, et sæpe sanguinis particulis intermixta; progressu verò copiosior et magis concocta, sanguine etiam permixto. Febris pari passu incedit cum tussi, sputo sanguinis, dolore, et pro ratione liberioris expectorationis sensim imminuitur; nunc alvus est astricta, nunc soluta nimis, Eductus è vena sanguis sevi liquati speciem præ se fert, ubi refrixerit.

D

Mittatur

Mittatur sanguis è brachio lateris affecti ad unc. decem.

R. *Aq. Papav. Rhœad. unc. quatuor, Sal. Prunel. drachm. unam, Syr. Violar. unc. unam. Misce, fiat Haustus, fumendus statim à prima Venæsectione.*

R. *Amygd. dulc. excorticat. N° quinque, sem. Melon. Pepon. ana semunc. sem. Papav. alb. drachm. tres. aq. bord. sesquibr. aq. Rosar. drachm. duas, cum s. q. Sacchar. cand. Fiat s. a Emulsio. Capiat unc. quatuor quartâ quâque horâ.*

R. *Decoct. Pectoral. libr. duas, Syr. Violar. et Cap. Ven. ana fescunc. * Misce, fiat Apozem. Capiat semilibr. ter in die*

R. *Ol. Amygd. dulc. unc. duas, Syr. Violar. et Cap. Ven. ana unc. unam, Sacchar. cand. q. s. Misce, fiat Eclegma; de quo sæpe lambat.*

Oleum Amygd. dulc. per se vel Oleum sem. Limi recēter extract. exhiberi potest.

R. *Ol. Amygd. dulc. Lilior. et unguent. Dialthææ, ana unc. unam. Misce, fiat Linimentum; quo inungatur latus affectuum manè et serò; superimponendo fol. Brassicæ.*

Repetatur

Repetatur Venæsectio ad tres alias vices ad eandem quantitatem, quatuor diebus continuis, ubi dolor et respirandi difficultas suadent.

De Peripneumonia notba.

Ingruente Hyeme, et sæpe sub ejus exitum emergit; insultu primo nunc incalescit, nunc friget æger; ex motu quolibet vertiginosus est, rubent et inflammantur genæ oculique, tussit, et inter tussendum dolor capitis lancinans premit, potulenta vomitu rejicit; urina turbida est et intensè rubet, sanguis pleuriticorum æmulus, anhelus crebrò et celeriter spiritum ducit dolente thorace. Ab asthmate sicco planè distinguitur, quòd in isto nusquam comparant febris indicia, in hac manifestò se produnt; licet minora longè et magis obscura, quam in peripneumonia vera

Mittatur sanguis è brachio dextro ad unc. decem. Die sequenti æger hanc potionemumat :

R. *Cassia extract. unc. unam, Glycy. drachm. duas, Ficus pingues No quatuor, fol. Senn. drachmas duas et semidrachm. Agaric. trochiscat. drachm. unam. Coq. f. q. aquæ ad unc. quatuor, in colatur. dissolv. Mannæ unc. unam, Syr. Rosar. solut. semunc.*

Si verò potionem assumere nequeat, capiat
Pil. Coch. maj. scrup. duos, horâ quartâ matutinâ.

Sequenti die celebretur iterum Venæsectio,
ad eandem quantitatem; ac postero die repeta-
tur Catharsis; quæ porrò repetenda est alternis
diebus, vel post majora intervalla, pro ratione
virium: atque insuper si Symptomata non cessa-
verint, extrahatur iterum sanguis semel adhuc,
bis, vel sæpius, diebus aliquot interjectis, prout
res postulaverit; sed ut plurimum Venæsectio
bis celebrata sufficiet. Interim, dum hæc fi-
unt, præsertim in diebus à purgatione vacuis,
utatur *decocto Pectorali, Eclegmate, et oleo Amygd.*
dulcium, in Pleuritide descriptis.

De Rheumatismo.

Rigorem et horrorem, et cætera febrium sym-
ptomata patiuntur; elapso die uno alterove
(est et ubi citius) dolor adest atrox, nunc in hoc,
nunc in illo artu, in carpis, humeris et genu-
bus præsertim, vicissim hos relinquens et illos
occupans; rubore, et tumore in parte, quam
postremum affecit, adhuc residuis. Febris sen-
sim evanescit, manente dolore; quin et nonnun-
quam immaniùs sæviante. In lumbagine rheu-
matica immanis dolor adest, circa lumborum
regionem

regionem fixus, nephritim mentiens, nisi quòd æger non vomituriat, qui procumbere nequit; sed vel è lecto exilit, vel super eodem erectus sedet, corpore perpetuâ agitatione nunc versus anteriora, nunc posteriora inclinato. Sanguis pleuriticorum similis.

Mittatur sanguis è brachio lateris affecti ad unc. decem.

R. *Aq. Nymph. Portulac. Lactuc. ana unc. quatuor, Syr. de Limonib. fescunc. Syr. Violar. unc. unam. Misce, fiat Julap. de quo bibat ad libitum.*

Præscribenda *Emulsio quatuor Sem. frigid. maj. Cataplasma è mica panis albiss. et lacte Croco tincto applicetur parti dolenti.*

Die sequenti eadem sanguinis quantitas detrahatur; atque iterum, die uno vel altero interjecto, reiteretur; atque porrò quater vel pluries, si opus fuerit: hoc observando, ut post secundam Venæsectionem, majora sint intervalla inter singulas sanguinis missiones.

Diebus à Phlebotomia vacuis *Enema è lacte saccharato subinde injiciatur, vel sequens:*

R. *Decoct. commun. pro Clystere libr. unam, Syr. Violar. et Sacchar. culinar. ana unc. duas. Misce, fiat Enema.*

Si imbecillitas ægri repetitionem Phlebotomiæ

miæ non ferat, tum, post secundam vel tertiam Venæsectionem, Curatio hac methodo tentanda.

Capiat alternis diebus *potionem purgativam communem*, donec convaluerit, et iisdem noctibus Paregoric. ex *Syr. de Mecon.*

Sin his remediis non cedat, & æger ob imbecillitatem evacuationes qualescunque ferre nequeat, aggrediatur usum *Elect. & aq. Antiscorbutic.* in scorbuto descript. quæ etiam remedia locum habent in Rheumatismo Scorbutico.

In Juvenibus, atque iis qui temperatè vixerunt, vino non plus æquo dediti; Rheumatismus *Dieta* simplici admodum refrigerante & mediocriter nutriente, æque feliciter, ac repetitis Venæsectionibus (quas minus ferre queant) profligari potest. Ex. gratiâ,

Solo *Lactis fero* ad dies quatuor vescatur æger; postea præter serum pane similigineo semel in die loco prandii, donec penitus convalescat; nisi quòd postremis diebus iterum panem in cœnam indulgere liceat. Symptomatis cessantibus, carnes pullorum elixorum, cæteraque eupepta concedantur; tertio autem quoque die solo lactis fero victitet, donec tandem pancreaticè valeat.

De Febre Erysipelatosa.

Nulla non corporis pars, præsertim facies, tumet, dolet & summè rubet; pustulæ densæ, parvæ, in vesiculas subinde facessunt, quæ per frontem caputque serpunt; oculi tumore obruti, rigor & horror, atque reliqua febris indicia adsunt. In alia hujus morbi specie, liquorum attenuantium potationi superveniente, febricula adest, pustulæ urticarum puncturas referentes; nonnunquam in vesiculas sublata, mox recedentes, tuberculorum more sub cute se condentes, maximè pruriunt, & scalpendo rursus apparent. Est & alia eruptionis species, pectus ut plurimum obsidens; macula nimirum lata, cuti vix supereminens, porriginosa cum squammulis flavis; qua vigente, æger bene se habet, eadem evanescente, leviter ægrotat; urina turbida & flava. Iisdem remediis, quibus pruritus ferinus, cedit; vino utatur æger & carnibus eupeptis.

Mittatur *sanguis* è brachio ad unc. novem vel decem. Die sequenti sumat *portionem communem purgativam*.

R. Rad. *Althææ* & *Lilior.* ana unc. unam, fol. *Malv.* *Sambuc.* *Verbasc.* flor. *Chamæmel.* *Melilot.*
summitat.

summitat. Hyperic. & Centaur. minor. ana manipulum unum, sem. Lini, Fœnugræc. ana semunc. Coq. s. q. aq. ad libr. tres. Coletur liquor, & tempore usûs, adde singulis libris decocti Sp. Vini unc. duas. Stuphæ è panno laneo huic decocto immersæ, ac expressæ, calidè admoveantur bis in die, & pars affecta post fotum sequenti mixturâ illinatur.

R. Sp. Vini semilibr. Theriac. Androm. unc. duas, pulv. Piperis longi, & Caryophyll. ana drachm. duas. Fiat mixtura; quâ Charta Emporetica madefacta, parti affectæ circumvolvatur.

Si primæ Venæsectioni non cedat morbus, tum repetatur; & nondum cessante, ad duas alias vices celebretur, interposito semper die uno.

Diebus à Venæsectione liberis *Enema è Lactetum Syr. Violarum, Emulsio refrigerans, & Julap. refrigerans, sunt præscribenda.*

De pruritu ferino, & inveteratis cutis eruptionibus, quæ Venæsectioni & Catharsi non cedunt.

R. Theriac. Andromach. semidrachm. Elect de Ovo scrup. unum, rad. Serpentar. Virgin. subtiliss. pulver. gr. quindecim, Lapid. Bezoar. oriental.

ental. gr. quinqae, cum f. q. Syr. è conditur Citri.
Fiat Bolus, horâ somni sumendus per dies
viginti & unam, superbibendo cochl. sex,
sequent. Julapii:

R. Aq. Card. Benedict. unc. sex, aq. Epidem.
& Theriacal. stillat, ana unc. duas, Syrup. Cary-
ophyll. unc. unam. Misce, fiat Julap.

Singulis mantutinis capiat liquoris possetici
 semilibr. calidè, & sudet horæ unius spatio.

His finitis, si pustulæ adhuc non evanuerint,
 sequenti Linimento partes affectæ inungantur :

R. Unguent. ex Oxylapatho unc. duas, unguent.
Pomati unc. unam, flor. Sulpur. drachm. tres, ol.
Rhodii semisrup. Fiat Linimentum.

Veruntamen Medicamenta præscripta haud
 usurpentur, nisi Venæsectione & Catharsi ritè
 præmissis.

De Angina.

A Ngina inter Ver & Æstatem ut plurimum
 aggreditur. Sequuntur febris insultum
 dolor & faucium inflammatio; unde à tumore
 uvulæ, tonsillarum, & laryngis, nec deglutire
 queat æger, nec spiritum ducere.

E

Mittatur

Mittatur sanguis è brachio copiosè. Tangantur partes inflammatae melle Rosaceo, Sp. Vitrioli, vel Sp. Sulphuris ad summum acorem permixto, vel Sp. Vitrioli solo. Mox Gargarisma sequens usurpetur, non vulgari modo; sed ita ut sine ulla agitatione in ore contineatur, donec incalescat; dein expuatur, & repetatur subindè.

R. Aq. Plantag. Ros. rubr. & Sperm. Ranar. ana unc. quatuor, album. Ovor. in aquam agitando redact. N^o tres, Sacchar. crysall. drachm. tres. Misce, fiat Gargarisma.

Emulsio refrigerans, in Pleuritide descripta, indies fumatur.

Sequenti manè, nisi febris & dolor inter deglutendum remiserint, Venæsectio repetatur; Catharsi in diem posterum rejectâ, aliàs Catharticum lenitivum exhibeatur.

Manente adhuc affectu (quod oppidè rarum) repetatur adhuc Venæsectio, & Catharsis: Epispasticum amplum ac forte applicetur cervici post primam Venæsectionem.

Omni manè, nisi diebus purgationi datis E-nema refrigerans & Emolliens injiciatur. Diætâ tenui utatur æger; & lecto per horas aliquot quotidie absistat.

In his omnibus Febribus, quas intercurrentes appello,

appello, ut etiam in illa, quæ stationaria est, cautè observandum, quòd æger à lecto abstineat magnam diei partem; ut jusculis hordeaceis, avenaceis, ac id genus aliis victitet; & cerevisiam tenuem lupulatam & hydrogalam pro potu ordinario bibat.

De Morbillis.

INfantes plerumque impetunt. *Primo* die rigent horrentque, calent & frigent alternatim. *Secundo* consummatam febrim accerfunt. Ægritudo vehemens, sitis, inappetentia, lingua alba (non verò sicca) tussicula, capitis & oculorum gravedo, & somnolentia perpetua, acriter premunt; humor è naribus & oculis jugiter stillat: quæ lachrymæ certissimum morbillorum signum. Huc accedunt sternutatio, tumor palpebrarum paulo ante eruptionem, vomitus, diarrhœa, cum dejectionibus colore viridi, indolentibus præsertim. Symptomata ingravescent ad *quartum* usque diem; quo quidem die (nonnunquam *quinto*) in fronte & facie maculæ parvæ, rubræ, pulicum morsibus persimiles prodeunt, quæ numero & magnitudine auctæ racematim coalescunt, & faciem maculis rubris majusculis interstinguunt: Hæ maculæ è par-

E 2

vulis

vulis papulis, supra cutim paululum elevatis conflantur, quarum protuberantia digito levi, vix oculorum acie deprehendi possit.

A facie, quam primò solùm occupant, ad pectus ventremque, crura deinde tibiaeque propagantur maculae: in his autem partibus latae & rubrae, superficiem cutis non superantes conspiciuntur. Eruptione morbillorum non perinde deliniuntur Symptomata ac in variolis. Vomitus post eruptionem nullus; sed tussicula & febris cum spirandi difficultate intenduntur, in oculos defluxio, somnolentia & inappetentia perseverant. Die *sexto*, aut circiter frons & facies asperescunt, emorientibus pustulis, ruptaque cuticulâ; in reliquo corpore maculae latissimae sunt, & maximè rubescunt. *Octavo* circiter die in facie evanescunt, & vix in reliquo corpore permanent. *Nono* nullae prorsus sunt; per faciem verò, & artus quandoque, & totum corpus in farinam quandam & squammulas facessunt; & tunc temporis febris, spirandi difficultas & tussicula augentur. In adultis à calido regimine livescunt primò, mox nigrescunt exanthemata.

R. *Decoct. Pectoral. sesquilibr. Syrup. Violar.*
 & *Cap. Ven. ana jescunc. Misce, fiat Apozema.*
 Capiat

Capiat unc. tres vel quatuor, ter vel quater in die.

R. Ol. Amygd. dulc. unc. duas, Syr. Violar. & Cap. Ven. ana unc. unam, Sacchar. cand. albiss. q. s. Misce, fiat Eclegma; de quo sæpius lambat; præcipuè quando tussis urget.

R. Aq. Cerasor. nigr. unc. tres, Syr. de Mecon. unc. unam. Misce, fiat Haustus, singulis noctibus sumendus, à primo morbi insultu, usque dum convaluerit æger; dosin augendo vel imminuendo pro ratione ætatis.

Æger se contineat in lecto per biduum post primam eruptionem.

Si post Morbillorum discessum, Febris, respirandi difficultas, & alia Symptomata Peripneumoniam mentientia supervenerint, sanguis liberaliter extrahendus è brachio, semel, bis, vel ter, prout opus fuerit; convenienti spatio interposito inter singulas Venæsectiones. Atque etiam continuentur decoctum Pectorale supra descriptum, ut & Loboch. vel. Ol. Amygd. dulc. per se. Circa diem duodecim ab invasione Cathartico lenienti purgetur.

Diarrhœa, quæ Morbillos excipit, Venæsectione sanatur.

De Variolis.

Distinctæ sunt vel confluentes: & in distinctis invadunt rigor & horror, calor intensus, capitis & dorfi dolor vehemens, vomitatio: in adultis ingens in sudores propensio (& hinc minime confluxuras esse licet conjicere), dolor sub scrobiculo cordis si manu præmatur, stupor & somnolentia; nonnunquam & insultus epileptici, in infantibus præsertim: quibus si dentitioni peractâ corripiantur, in procinctu esse variolas possis prædicere; ita ut si fortè insultum epilepticum sub vesperam patiantur, sequenti aurorâ in conspectum se daturæ sunt variolæ, mites ut plurimum & rarissimè confluentes.

Quarto inclusæ ab invasione die, nonnunquam seriùs, rarò tamen ante illum erumpunt; quo tempore vel minuuntur Symptomata, vel prorsus evanescunt. In eruptione autem subrubræ primò pustulæ, tenuissimarum acicularum puncta æquantes, sparsim se produnt per faciem, collum, pectus, & corpus universum; tunc in faucibus dolor, qui cum pustulis surgentibus augetur.

• Circiter *octavum* à primo insultu diem intervalla postularum, priùs alba, rubere jam incipiunt, in tumorem attolli, & dolore tensivo affici; extenduntur

extenduntur palpebræ, & ut vesica inflata, oculos claudunt. Proximæ à facie intumescunt manus, digitique distenduntur; pustulæ faciei antea læves & rubræ, jam asperæ (primum maturationis indicium) & subalbidæ apparent; succum insuper luteum, colore à favo non abludentem evomunt; faciei & manuum inflammatio jam summa in pustularum instertitiis colorem exhibet floridum, & rosarum Damascenarum æmulum; quem quidem colorem, quo mitiores sunt variolæ, eo magis tum pustulæ tum cutis interjecta ad amissum exprimunt. Quæ faciem occupant pustulæ, asperiores quotidie ac magis flavæ pro maturationis ratione; quæ manus & reliquum corpus, minùs asperæ albæque magis, conspiciuntur indies.

Die *undecima* faciei tumor & inflammatio recedunt; pustulæ maturæ & justam magnitudinem (viz. *pisi grandiusculi*) adeptæ exarescunt deciduntque: *decima quarta* vel *quinta* pereunt funditus. Manuum autem pustulæ pertinaciores, albæ adhuc & recentes die uno aut altero moras trahunt, tandem dirumpuntur; exteræ autem, faciei nimirum & corporis desquamantur, & in facie squamulis hisce furfuraceis succedunt foveæ.

Per totum morbi decursum alvus vel prorsus constipatur, vel rarissimè deject.

Maxima

Maxima eorum pars, qui ex hoc morbo pereunt, octavo die in discretis, undecimo autem in confluentibus intereunt: Quippe cum in discreto hoc genere promoventur sudores tum cardiacis, tum regimine calidiore, prædicto die facies, quæ turgida, & per interstitia pustulis interjecta inflammari debuerat; è contra, flaccida reperitur & albescens, pustulis nihilominus rubentibus & elevatis, etiam post ægri mortem; sudor, qui huc usque manaverat, derepentè evanescit; æger interim phrenitide corripitur, anxietate, jactatione, ægritudine, vehementibus; urinam parcè reddit ac frequenter; & tandem paucissimarum horarum spatio ad plures migrat.

In CONFLUENTIBUS eadem Symptomata (sed atrociora) febris scilicet, anxietas, ægritudo, vomituritio, &c. immanius sæviunt; licet non ita promptè, ac in discretis, in sudores dissolvitur æger. Diarrhœa nonnunquam eruptionem præcedit, & ad diem unum aut alterum post illam protrahitur, quod in discretis vix contingit.

Tertio die, aut citiùs, rarò tardiùs, erumpunt; & quo citiùs, eo magis confluunt. Quandoque ad quartum vel quintum diem differtur eruptio ob atrox aliquod symptoma, verbi gratiâ, acutissimum dolorem in lumbis, nephritici æmulum, in latere pleuritici, in artubus rheumatici, in ventriculo cum ingenti ægritudine & vomitu. Non perinde

perinde ac in discretis, mox ab eruptione remittunt symptomata, sed & febris & alia ad multos etiam dies post eruptionem postularum ægrum discruciant. Nunc erysipelatis ritu, nunc morbillorum erumpunt; eruptionis licet tempore plane distinguantur.

Crescente morbo, non in molem aliquam spectabilem attoluntur; sed in facie sibi invicem simpliciter, tanquam vesicula rubra, vultum omnem contegunt, quem maturius elevat quàm discretæ: postmodum ad instar pelliculæ albæ vultui agglutinatæ cutis superficiem non admodum superant.

Præterlapso die octavo, pellicula alba quotidie paulatim magis exasperatur, colore fusco: intensus magis est dolor cutis, donec tandem in aculentiori morbo non nisi post diem vicesimum rationibus laminis desquamatur. Hoc interim observatu dignum, quòd quanto pustulæ maturefcentes propiùs ad colorem subfuscum vergunt, eò deteriores lentiùs abscedunt; quo magis autem flavescent, eò minus confluerunt, & ociùs se proripiunt. Ubi primùm deciderit pellicula, nullà scabritie vultus afficitur; at vero mox illam excipiunt squamulæ furfuraceæ, indolis perquam corrosivæ, quæ foveas relinquunt patentiores, & sæpe cicatrices. Quandoque humeri & dorsum cuticulâ denudantur. Morbi

periculum à pustularum frequentia & numero in facie solâ, æstimandum. Pustulæ manuum & pedum majores, & quo altiùs ab extremitatibus artuum ascenderis, eo sensim minores & contritiore extant. In adultis salivatio, in infantibus diarrhœa (licet non ita certò) confluentior comes. Ptyalismus nunc cum eruptione se prodit, nunc *biduo triduo* præterito, materiam primò tenuem, die *undecimo* viscidiorē ægerrimè excreat. Siticulosus est æger, voce raucâ, somnolentiâ & stupore ingentibus corripitur, inter bibendum subinde tussit, & potus per nares revertitur. Tunc cessat, ut plurimum salivatio, cui nisi faciei intumescencia (quæ licet hoc ipso die pro morbi genio aliquantisper remitti debeat, non tamen nisi post diem unum alterumve omnino recedere) & manuum jam insigniter incipiens, & diutiùs perdurans suppetias tulerint, ægro protinus moriendum est. Diarrhœa non ita maturè infantes occupat, ac ptyalismus adultos.

In utraque variolarum specie febris ab insultu ad eruptionem dominatur, inde dat induciâ ad pustularum maturationem, quâ peractâ, desinit.

Superveniunt à malo regimine symptomata anomala; qualia sunt, postularum flacciditas & subsidentia, phrenitis, coma, maculæ purpureæ

reæ pustulis interspersæ, & in earum summitate maculæ nigræ exiguæ in medio subsidentes, sanguinis mictus & sputum sub initio morbi, urinae suppressio.

Seperationis tempus cum febrili ebullitione tribus vel quatuor primis diebus transigitur. Expulsio per reliquum morbi tempus, mediantibus parvis abscessibus, in carne perficitur.

Dies in quo maximè periclitatur æger, in confluentibus in minimè crudo, & maximè vulgari genere, à primo morbi insultu, est undecimus, in crudiore adhuc decimus quartus, & in crudissimo decimus septimus; nonnunquam tamen, sed rarius, non ante diem vicesimum primum moritur æger. Quinimo per spatium illud omne, quod inter dies undecimum, & decimum septimum interjacet, appetente vespèrâ, molestissimo inquietudinis paroxysmo, quotidie vexatur æger.

Mittatur sanguis quovis ex tribus primis diebus ab invasione ad unc. novem vel decem; & postea Vomitorium exhibeatur, ad unc. unam vel fescunc. *Infusionis Croci Metallorum.*

His primis diebus diluatur sanguis frequenti potatione Cerevisiæ tenuis lupulatæ. Cui Vitrioli Spiritus immisceatur usque ad plenam pustularum eruptionem.

Cum Variolæ omnes eruperint (quod plurimum est sexto die post invasionem) vespere propinetur *Syr. de Mecon.* unc. una; quæ repetatur dehinc singulis noctibus ad diem decimum post invasionem. Eâ nocte, si Variolæ è Confluentium genere fuerint, augeatur dosi ad fescunc. quæ dein repetatur ad unc. unam, manè, & ad fescunc. serò, singulis noctibus, donec æger convaluerit.

Si *Syr. de Mecon.* minus congruat, substitui possit *Laudan. liquid.* viz. gutt. octodecim pro unc. una Syrupi, & gutt. viginti & quinquæ pro fescunc. Hoc interim observandum, quòd si Paregoricum, bis in die exhibitum, orgasmum compescere non valeat (quod in Variolis insigniter Confluentibus sub finem earum sæpe accidit) tum octavâ quâque horâ exhibendum, vel sæpius, si opus fuerit.

At si Variolæ interstinctæ fuerint, satis erit, ut solummodo singulis noctibus, post plenam eruptionem exhibeatur Paregoricum, atque etiam in minori dosi.

Qualiscunque autem generis Variolæ fuerint, atque etiam qualicunque morbi tempore, si Phrenitis acciderit, omnino oportet, ut inordinato spirituum motui frænum injiciatur; ac proinde si prior Paregorici dosi metam non attingat, alia atque alia assumatur, donec tumultus penitus

penitus compescatur; interposito inter singulas doses spatium aliquo, ut pernoscere valeamus, utrum dos ultima id, quod quaerimus, praestiterit, antequam nova ingeratur.

Si omnimoda urinæ suppressio acciderit, æger e lecto eximatur, & aliquantulum obambulet.

Si saliva ob calorem sit adeò viscida, ut expectorari non possit, tum Gargarisma cum syrinx saepe in fauces injiciatur. Componatur & *Cerevisia tenui vel aq. bord. cum Melle Rosarum*; vel sequens usurpari poterit:

R. Cort. Ulmi drachm. sex, rad. Glycyrrhiz. semunc. Passul. enucleat. No viginti, Ros. rub. pug. duas. Coq. f. q. aq. ad. sesquilibr. in colatur. dissolv. Oxymel. simp. & Mell. Rosar. ana unc. duas, Misce, fiat Gargarisma.

Si Epispastico opus fuerit, amplum satis & acre nuchæ applicetur nocte istâ, quæ magnam morbi crisin præcedit, mox ab assumpto Paregorico; plantis quoque pedum applicari potest Allium, à die octavo, usque ad morbi finem, singulis diebus renovandum.

Si infans de Symptomatis, dentitionem comitantibus, jam securus, derepente spasmo corripitur, hic cogitandum est convulsionem istam, fortassis à naturæ conatu, quæ Variolas, scarlatinam Febrem, aut Morbillos, in corporis habitum

tum protrudere satagit, pendere : applicetur itaque *Emplast. Epispasticum* nuchæ, lecto quamprimum committatur æger, exhibeatur insuper Cardiacum, cui Paregorici pauxillum est admiscendum, puero nempe trienni, *Laud. liquid. gutt. quinque in aq. Epidem. cochl. uno.*

Si die undecimo, vel alio quovis post eum, Febris secundaria cum inquietudine, jactatione, & cæteris id genus symptomatis, usque adeo efferatur, ut Paregoricis utcunque repetitis sufflaminari nequeat, & mors quasi immineat, tum sanguis ad satis magnam quantitatem illico detrahatur, nempe ad unc. duodecim, vel circiter; atque porro repeti possit semel vel bis in sequentibus diebus, si symptomatum dictorum ratio idem postulârit; at non alias. Catharsis etiam blanda die decimo tertio (non antea) vel quovis alio die eum insequente (modo Venæsectio præcesserit) institui possit, nempe ex *Electuarii Lenitiv. unc. unam, dissolut. in aq. Cicbor. vel lactis Alexeter. unc. quatuor.* Veruntamen nec Venæsectio nec Catharsis impediunt, quo minus Paregorica in usum veniant; quæ (haud obstantibus iis) tam quoad largam dosin, quam repetitam, exhiberi debent, si opus adhuc fuerit: nam adhæc in hoc morbo semper confugiendum.

Quando

Quando Pustulæ perfectè exaruerint, inungatur facies Linimento ex æqualib. partib. *ol. Amygd. dulc. & Pomat.* per biduum; at non ultra.

Die vicefimo uno post invasionem, mittatur sanguis è brachio; & sequenti die Catharsis celebranda, quæ porrò alternis diebus, ad tres alias vices, repetatur.

Quoad Regimen; è lecto abstineat ad sextum diem post invasionem; in quo postea se contineat usque ad decimum septimum, non aliis stragulis tectus, quàm quibus sanus uti solebat.

Fusculis Avenac. bordeac. Pomis coct. et Cerevisiâ tenui vicûtet; & post undecimum diem *Vini Hispanic. cochl.* quatuor vel quinque bis in die exhibeantur, si æger voluerit.

Si crurum tumor, non evacuationibus præscript. cedat, tum fotu *fol. Malv. Verbasc. Sambuc. Lauri,* cum *floribus Chamæmel. & Melilot.* in *Lactē coct.* facilè fugatur.

Si primis morbi diebus æger Hæmoptoë laboret, vel urinam reddat sanguineam, tum pulvis et tinctura, quæ in capite de Hæmoptoë præscribuntur, sextâ quâque horâ (donec symptomata ista prorsus cessaverint) diligenter exhibeantur. Quo etiam casu Paregorica liberali manu propinanda.

De Choreâ Sancti Viti.

Convulsionis species quædam est; pueri
puellæve à decimo ætatis anno ad puberta-
tem invadit. Prodit se claudicatione, vel insta-
bilitate alterutrius cruris, quod æger post se tra-
hit fatuorum more; manum ejusdem lateris,
vel pectori vel alii alicui parti applicitam, ne-
quit continere in eodem situ horæ momento, sed
in alium situm & locum convulsione distorque-
bitur, quicquid æger contra nitatur; antequam
poculum ad os possit adducere, mille gesticula-
tiones, circulatorum instar, exhibebit: Non
enim rectâ lineâ ori admovet, sed deductâ à
spasmo manu, huc illuc aliquandiu versat, do-
nec tandem fortè fortunâ, labris propius appo-
nens liquorem derepentè in os injicit, & avi-
dè haurit; deditâ tanquam operâ, ut spectan-
tibus risum moveret.

Sanguis ad unc. octo plus minus, pro ætate,
ex brachio educatur.

Die sequenti, dimidia pars, vel quiddam
amplius, pro ratione ætatis, *potionis commun.*
hauriatur; & vesperi haustulus sequens propi-
netur:

R. *Aq.*

R. *Aq. Cerasor. nigr. unc. unam, aq. Epilept. Langii drachm. tres, Theriac. Andromach. scrup. unum, Laudan. liquid. gutt. octo. Fiat Haustus.*

Potio Cathartic. ad tres vices, alternis diebus repetatur; & *haustus Paregoricus* iisdem notibus.

Postea sanguis iterum extrahatur; & ad Catharsin, uti prius, æger revertatur, & sic sanguis mittatur, & alvus subducatur ad tertiam quartamve vicem; spatio tamen inter alternas evacuationes observato, ut nihil periculi ægro immineat.

Diebus à purgatione vacuis sequentia præscribantur:

R. *Conserv. Absinth. Roman. & flaved. Aurantior. ana unc. unam, Conserv. Anthos semunc. Theriac. Andromach. vet. & Nuc. moschat. condit. ana drachm. tres, Zinzib. condit. drachm. unam, Syr. è succ. Citr. q. s. Fiat Electuar. de quo capiat ad magnitud. Nuc. moschat. manè, et horâ quintâ pomeridianâ, superbibendo vini sequentis cochlear. quinque:*

R. *Rad. Pæoniæ, Enul. Campan. Imperator. & Angelic. ana unc. unam, fol. Rut. Salv. Betonic. Chamædr. Marrub. alb. & summitat. Centaur.*

G

min.

min. ana manipul. unum, baccar. Juniper. drachm. sex, Cortic. duor. Aurantior. Incidantur & infundantur frigide in Vini Canarini libr. sex. Coletur tantummodo usûs tempore.

R. Aq. Rut. unc. quatuor, aq. Epilept. Lang. & Bryon. comp. ana unc. unam, Syr. Pæon. drachm. sex: Misce, fiat Julap. Capiat cochl. quatuor singulis noctibus cubitum iturus, instillando Sp. Cor. Cervi gutt. octo.

Applicetur plantis pedum Emplast. è Carama.

Ob Recidivæ metum pertundatur ei vena, & ad dies aliquot purgetur, eâ ipsâ anni sequentis tempestate (vel paulo ante) quâ morbus invasit.

Verisimile mihi videtur, quod hæc methodus curationi Epilepsiæ Adultorum convenire possit; quod tamen non adhuc expertus sum. Cum verò Chorea Viti ætates teneras adoriri soleat, in Epilepsia Adultorum tam sanguinis detrahendi quantitas, quàm Catharticorum dosis adaugeantur.

De Apoplexia.

SOmnus est profundissimus, & omnimoda sensûs & motûs privatio, excepta respiratione, quam ægri habent difficilem cum stertore.

Mittatur

Mittatur sanguis è brachio ad unc. duodecim quamprimum, ac postea ex venis jugularibus ad unc. octo: deinde *Vomitorium ex fescunc.* vel unc. duabus, *Infus. Croc. Metal.* propinetur statim.

Emplastr. Epispastic. satis amplum, ac forte cervici applicetur.

Dum hæc aguntur, erectus sedeat æger in lecto, nec stragulis nimis obrutus.

Sp. Sal. Armoniæ. optimè rectificatus admoveatur naribus.

Finitâ Vomitorii operatione, subinde exhibeantur cochl. tria vel quatuor sequentis Julapii:

R. *Aq. Rutæ unc. quatuor, aq. Bryon compos.*
 & *Antiepilept. Lang. ana unc. unam, Sp. Cor. Cervi gut. viginti, Sacchar. crysall. q. s. Fiat Julap.*

Vel cochleare unum *Sp. Lavendulæ compos.* per se propinare possit bis vel ter, durante paroxysmo, horâ dimidiâ vel integrâ interpositâ.

Cavendum est, ne Cardiaca plus justo callida, ac nimis frequenter (uti mos est) exhibeantur; nam quacunque demum specificâ virtute pollere videantur, plus damni quam emolumenti ægro apportant, utpote quæ humores fundere (ac proinde malum augere) apta nata

sunt: quod etiam incommodum non minùs infertur ex nimia stragulorum congestione.

Paroxyfmo jam finito, ad præcavendam recidivam sequentia exhibeantur:

R. *Pil. Coch. maj. scrup. duos.* Capiat ter tiâ quâque die per sex vices, horâ quartâ matutinâ, superdormiendo.

R. *Conserv. flor. Salv. Rorismarin. ana unc. unam, Conserv. flaved. Aurant. drachm. sex, Nuc. moschat. condit. & Zinzib. condit. ana semunc. Theriac. Androm. vet. drachm. duas, pulv. elect. Diamb. Diamosch. dulc. ana drachm. unam, cum s. q. Syr. conditur. Citr. Fiat Opiata.* Capiat ad magnitudinem castaneæ manè et ferò, superbibendo *aq. Epilept. Lang. cochl. duo.*

R. *Ambr. gris. semidrachm. Ol. destil. sem. Anisi, Cinnamom. Nuc. moschat. ana gutt. duas, ol. Caryophyl. gutt. unam, Sacchar. in aq. flor. Aurantior. solut. unc. quatuor. Fiant s. a. Tabellæ;* quarum capiat unam ad libitum.

Ab usu potùs generosioris cujusvis sibi temperet; vescatur juculis avenaceis, hordeaceis, ut & ex pullis gallinaceis confectis; & quandoque etiam

etiam (præcipue inter purgandum, carne pul-
lorum, agnorum, ac id genus ciborum eupepton.

De Ophthalmia.

EX oculorum inflammatione patet.

Mittatur *sanguis* è brachio ad unc. decem.
Sequenti die sumat *portionem purgativam commu-*
nem, quæ repetenda est per duas alias vices, duo-
bus diebus interpositis; iisdem noctibus sumat
haustum Paregoricum ex Syr. de mecon. unc. unam.

Diebus à purgatione vacuis sumat ter aut qua-
ter in die unc. quatuor *Emulsionis ex scm. frigid.*
maj. & Papav. alb.

R. *Aq. Plantag. Ros. rub. & spermat. Ranar.*
ana unc. unam, pulv. Tutie præparat. drachm.
unam. Fiat Collyrium; cujus guttæ aliquot in-
stillentur oculis bis in die; at non incipiendum,
nisi post primam purgationem.

Si his remediis affectus haud cedat, repeta-
tur Venæsectio semel vel bis (præcipue si san-
guis Pleuriticus apparuerit) ut etiam Catharsis.

Abstineat ab usu vini & cujusvis liquoris ge-
nerosi; ab usu etiam ciborum coctu difficilium,
& sale conditorum; & diebus inter purgationes
bibat *hydrogalam* coctam.

Nota,

• Nota, quod sæpè accidit, quòd Venæsectioni & Catharfi utcunque repetitis Ophthalmia non cedit; hoc in casu *Paregoric. ex Syr. de Mecon. unc. unam*, singulis noctibus exhibitum, curationem sine aliorum suppetiis absolvit.

De Uteri Procidentia.

R. *C*ort. *Querc. unc. duas. Coq. in aq. font. libr. quatuor ad libr. duas, sub finem addendo Cortic. Granator. contus. unc. unam, flor. Ros. rub. Granator. ana manipulos duos; dein adde Vini rubr. semilibr. Colatura fit pro Fotu; qui cum pannis laneis parti affectæ admoveatur manè horis duabus, antequam è lecto assurgat, & nocte post decubitum, donec Symptoma penitus evanuerit.*

De Paroxysmo Nephritico.

*A*dsunt dolor fixus in lumborum regione; urina cruenta; arenularum aut calculi excretio; stupor cruris è directo renis laborantis; testis retractio ejus lateris, in quo est dolor; nausea & vomitus. Dolor colicus Nephritico haud absimilis; licèt in quibusdam symptoma-
tis

tis planè discrepet, quæ recensita in Capite de *Colica biliosa* videas.

Si æger temperamento sanguineo fuerit, mittatur sanguis è brachio affecto reni respondenti unc. decem; dein *liquoris possetici*, cui *Rad. Althææ* unc. duas, *incoctæ* fuerint Cong. unum, quam citissimè deglutiat; & Enema sequens injiciatur:

R. *Rad. Althææ* & *Lilior. ana* unc. unam, *fol. Malv. Parietar. Branc. Ursin. & flor. Chamæmel. ana* manipulum unum, *sem. Lini & Fænugr. ana* semunc. Coq. s. q. aq. ad sesquilibr. Misce, fiat Enema. Rejēctis Vomitorio & Enemate, *Laudani liquid. satis magna dosis* propinetur, viz. ad gutt. viginti & quinque, vel *Pill. Matth. gr. quindecim* vel sedecim. In senibus verò, & morbo diuturno fractis, ut & vetulis Vaporibus obnoxiiis (præcipuè si sub initium Paroxyfmi urinam eæ reddant nigram & sabulosam) Venæsectio omittatur; at quoad reliqua, eadem quæ dicta est viâ omnino procedendum.

In miſtu Sanguineo a Calculo renibus impacto.

Capiat æger, ſtato quodam die, ſingulis hebdomadis, *Mannæ* unc. duas & ſem. in *ſeri Lactis* libr. duas ſolutas.

Conducit

Conducit aliquando, haustus cerevisiæ tenuis liberalior.

In calculo renum grandiori, dolor hebes, & obtusus, nullatenus auctus, sed fatis tolerabilis perferitur, nec paroxysmus nephriticus comitatur.

Aquis chalybeatis æger se non tutò committet, nisi prius certò sciat, calculum majorem non esse, quam ut per ureteres viam possit invenire; quod, hoc tantum modo, certò potest dignosci, si nempe, jam antea, paroxysmum aliquem nephriticum fuerit perpeßus, (cum dolore scilicet sævissimo in renum alterutro, per ureterum ductus propagato, & vomitu enormi) pro compertò habeat, non tam grandiore aliquem calculum pelvi concludi, quam lapillorum exiguorum congeriem; quorum unus subindè in ureterem illabitur, atque ita paroxysmum invitat; qui fere non desint, nisi calculo in vesicam detruso: cum sic se res habeat, nullum est magis efficax remedium, quam *aquarum chalybeatarum* potatio: quod si calculosus nullo unquam paroxysmo nephritico fuerit tentatus, cum jam major sit calculus, quam qui ex pelvi possit elabi, devitandæ sunt aquæ ferreæ.

De Dysenteria, Diarrhœa, & Tenefmo.

Rigent horrentque; sequitur deinde totius corporis calor; quem brevi excipiunt ventris tormina; & hæc dejectiones crebræ, mucosæ omnes (nisi quòd stercorosæ nonnunquam interponantur) cum ingenti cruciatu & molestissimo viscerum omnium quasi descensu, quoties exoneratur alvus; sanguinis interim lineamentis intertextæ, licèt aliquando ne minimum sanguinis per totum morbi decursum admisceatur. Progressu morbi sanguis sincerus quandoque excernitur, & gangrænâ insanabili afficiuntur intestina. Si æger ætate floreat, vel cardiacis incalescat, febricitat admodum; lingua est subalbida, quadam mucilagine densè obsita, interdum nigra & sicca. Prosternuntur vires, dissipantur spiritus; aphthæ insuper oris interna faucesque obsident, præsertim ubi materiæ peccantis evacuatio adstringentibus præpostere impeditur, non exacto per cathartica morbi fomite. Aliquando, exulante febre, agmen ducunt tormina, & cætera morbi symptomata sequuntur.

In *Diarrhœa* humores excrementitii sine sanguine aut intestinorum exulceratione excernuntur.

H

In

In *Tenesmo* assidua est desidendi cupiditas; nihil tamen præter mucosum quoddam & subcruentum aut purulentum rejicitur.

Mittatur sanguis è brachio quamprimum, eademque nocte *Paregoricum* propinetur; & mane sequenti *Potio purgans communis*, repetenda alternis diebus ad duas alias vices; & *Paregoric.* post Purgationes, quam primum suo de-functæ sunt munere; ac diebus à purgatione vacuis idem manè & ferò est exhibendum.

Post Venæsectionem & Catharsin semel celebratam, per totum morbi decursum, sequens Cardiacum exhibeatur :

R. *Aq. Ceras. nigr. & Fragor. ana unc. tres, aq. Epidem. Scord. comp. & Cinnam. bordeat. ana unc. unam, Margarit. præparat. sesquidrachm. Sacchar. crystall. q. s. adde aq. Rosar. Damascen. sem. unc. ad gratum saporem. Misce, fiat Julap. de quo capiat cochl. quatuor vel quinque in languoribus, vel ad libitum.*

Potus fit *Lac coctum cum aq. triplo*, vel *Decoct. alb.* ut,

R. *Cor. Cervi calcin. & micæ panis alb. ana unc. duas. Coq. in aq. font. libr. tribus ad libr. duas; postea s. q. Sacchar. albiss. edulcoretur. Vel si dejectionum virium postulaverit, aq. font. libr. duas, cum Vis. Canarin.*

Canarin. semilibr. simul coctæ, pro potu frigide as-
sumantur.

Cum per tres vices purgatus fuerit æger, tota
curatio usui *Laudani* bis vel ter in die repetiti
postea incumbit, nisi quòd *Enema ex Lac. vaccin.*
semilibr. & Theriac. Androm. fescunc. subinde
injiciatur, quod in alvi egestionibus mire con-
fert.

Cum alvi fluxus in Diarrhœam tantum as-
furgat, Phlebotom. & Catharsi præscript. omif-
fis, seq. Bolus singulis matutinis exhibeatur :

R. *Rhabarb. pulv. semidrachm. (plus minus pro
ratione virium) cum f. q. Diascordii. Fiat Bolus,*
addendo ol. Chym. Cinnam. gutt. duas.

Noctibus insequentibus *Paregoric. ex aq. Cin-
nam. bordeat. unc. unam, & Laudan. liquid. gutt.*
quatuordecim, exhibeatur.

Ubi tormina sicca sine dejectionibus ex-
cruciant, curantur diluendo *sero lactis* frigide pro-
pinato, & tepide injecto ; ut in Cholera morbo,
pullorum jusculo aut lacte cerevisiato.

Si hic morbus diutius excurrat, adeò ut omnis
ejus vis in rectum intestinum decumbat, cum
assidua desidendi cupiditate, *Diæta Analeptica*
instituitur, & liquor aliquis Cardiacus pro libitu
ingeratur, ut restaurari possint vires, quibus re-
deuntibus, Tenesmus sponte se proripit.

In Dysenteria malè curata dolores aliquando ægrum ad annos aliquot discruciant; in hoc casu Phlebotomia repetita pristinam sanitatem restituet.

Notandum est, quòd in constitutionibus huius morbo minùs faventibus omissis evacuationibus Dysenteria *Laudano* solo sanatur; quod manè & serò repetendum, donec symptomata penitus evanuerint, vel etiam ter Nycthemeri spatio, si opus fuerit.

De Colica biliosa.

INtestinorum dolor atrocissimus est: per horas aliquot affligit febris in hunc morbum deficiens, qui aut quasi injectâ fasciâ constringit, aut in punctum contractus quasi terebello perforat; subinde remittitur, mox recrudescit. Sub initio non ita certò ad unum aliquod punctum determinatur, neque tam crebra vomituritio, neque alvus ita pertinaciter catharticorum vim eludit; quo autem magis augetur dolor, eo obstinatiùs in puncto figitur, vomituritio frequentior & major alvi adstrictio, Colicâ tandem in iliacam transeunte. A nephritide sic distinguitur. 1. Dolor nephriticus fixus in rene est, & ab eo ad testem exporrigitur secundum longitudinem

dinem ureteris : Colicus verò vagus est, & cinguli instar medium ventrem affligit. 2. A pastu Colicus dolor augetur : Nephriticus potius imminuitur. 3. In Colico dolore, ab excretionem per alvum & per vomitum majus levamen emergit, quam in nephritico. 4. In dolore nephritico urina primùm clara & tenuis, postea aliquid subsidet, & tandem arenulæ aut lapilli excernuntur : In Colica urinæ ab initio crassiores existunt.

Sanguis è brachio paulò liberaliùs educatur, & post horas tres vel quatuor *Anodyn.* exhibeatur. Postero die *Catharticum lenitiv.* & interposito die uno, ad tertiam vicem propinetur.

At si malum hoc fructibus horariis, vel aliis cibis avidè ingestis, originem debeat, tum ventriculus ante omnia lacte cerevisiato affatim hausto eluendus est ; quo exantlato Anodynum propinandum est ; sequenti autem die vena secanda est, & in ordine præscripto procedendum.

Ubi hic morbus minùs peritè tractatus diutissimè fatigaverit, & ægrum penè confecerit, liberalior sive *aquæ Epidem.* sive *Mirab.* sive aliùs cujuscunque, quâ sanus maximè delectabatur, usus, ægrum hoc tempore ultra spem omnem juvit.

De Cholera Morbo.

INtra Augusti limites se continens, vix in priores Septembris hebdomadas evagatur. A crapula & ingluvie excitatus similis affectus, nullo temporis discrimine insurgit; qui licet eodem curetur modo, alterius tamen est subsellii. Adfunt vomitus enormes, ac pravorum humorum cum maxima difficultate & angustia per alvum dejecto; ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio & distentio; cardialgia; sitis; pulsus celer ac frequens, parvus & inæqualis; æstus & anxietas, nausea molestissima, sudor, crurum & brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas, & similia, quæ ægrum in viginti & quatuor horarum spatio interimunt.

Pullus tenerior in tribus circiter *aq. font.* congruis elixetur, ut carnis saporem vix perceptibilem liquor referat: hujus decocti, vel, defectu ejus, liquoris possetrici capaciores aliquot cyathos æger tepidè exhauriat; & eodem tempore ex eodem liquore *Enemata* successive repetenda. *Haustibus & Clysteribus Syr. Læuc. Violar. Portulac. Nymph. eorumve* alicujus *uncia* subinde admisceri poterit.

Exantlato

Exantlato hoc Eluvionis penso (quod tres vel quatuor horas sibi vendicat) *Paregoricum* curatiori Coronidem imponit.

Si non accesserit Medicus, nisi postquam æger vomitu & dejectionibus per multas horas continuatis fuerit exhaustus; & jam frigescant membrorum extrema, tum ad *Laudanum liquidum* confugiendum est in paulò majori dosi (viz. *Laudan. liquid. gutt. viginti & quinque in aq. Cinnam. fort. unc. unam*); & cum cessaverint symptomata, nihilominus manè & serò quotidie est repetendum; at in minori dosi, donec pristinas vires receperit.

Est species quædam Cholerae morbi infantibus valdè familiaris, ac sæpenumerò funesta, ex Dentitione vel Crápula originem ducens.

Horum ætas tenella minime fert, ut diluatur ventriculus largâ liquorum potatione, multo minus ut Cathartici tumultus major in humoribus excitetur; sed Curationem *Laudano* solo aggredi oportet; quamobrem *gutt. duas, trës, vel quatuor, vel plures*, pro ratione ætatis, cochl. uno, cerevisiæ tenuis, vel aquæ cujuscvis appropriatæ instillatæ, exhibeantur, repetanturque, ut opus fuerit.

De Colica Piſtonum.

ES t ſpecies quædam Colicæ, quæ degenerare ſolet in Paralyſin, & motûs omnimodam manuum ac pedum depravationem; quam hoc nomine *Riverius* in capite de paralyſi indigitat, & apud *inſulas Caribum* notiſſima eſt; utpote quæ magnam vim hominum infeſtat.

Hunc dolorem atrociffimum ſanat *Baſam Peruv.* frequenter ac in magna doſi exhibitum, nempe ſi *ejuſ gutt. viginti, triginta, quadraginta, Sacchar. albiff. cochl. uno inſtillantur*, & bis vel ter in die dentur: at Paralyſis huic remedio haud cedit.

De Illiaca Paſſione.

Periftalticus inteſtinorum motus invertitur; propinata cathartica & injecta enemata, in emetica ſtatim tranſeunt; alvi fæces per vomitum rejiciuntur.

Mittatur ſanguis è brachio dextro ad unc. novem vel decem; poſt aliquot horas exhibeatur ſequens Pulvis:

R. *Reſin. Scammon. vel, defectu ejus, Reſin. Julap. gr. duodecim, Calomelan. Torquet. ſcrup.*

unum.

num. Misce, fiat Pulvis. Capiat è cochleari uno lactis vaccini, superbibendo ejusdem lactis cochl. unum vel alterum: vel si forma pilularum magis arrideat:

R. Pil. ex duobus semidrachm. Calomel. Torquet. scrup. unum, cum s. q. Balsam. Peruv. Fiant Pil. quatuor, summend. è cochl. uno Syr. Violarum.

Sin autem æger hoc remedium per os rejecerit, *Laudan. liquid. gutt. viginti & quinque, aq. Cinnam. fort. semunc.* instillatæ statim propinentur; cum vero horum usu vomituritio, ac ventris dolores, remiserint, *catharticum* dictum iterum exhibeatur: verum si anodynorum virtute ac vi jam penitus infractis vomituritio ac dolor iterum redierint, cathartico interim in corpore resitante, ad usum *paregorici* supra descripti revertendum; idemque eò usque repetendum quartâ vel sextâ quâque horâ, donec intestinis quies omnino inducatur; quo quidem tempore catharticum operationem suam per sedes exeret.

Nec sanè abs re fuerit elapsâ horâ unâ, aut alterâ, post *Venæsectionem*, clysteram aliquem, ex iis qui potentiùs operantur, injicere, *fumum* scilicet *nicotianæ*, ex tubulo inverso, per vesicam majusculam, in intestina validissimè insus-

flatum ; quæ quidem operatio post aliquot horas reiterari debet, nisi citius meatus deorsum pateat.

Finitâ operatione Cathartici, sumat sequentem haustum :

R. *Aq. Cinnam. fort. unc. unam, Laudan. li-
quid. gutt. viginti & quinque. Misce, fiat Hau-
stus ; qui porrò repetendus, est bis, ter, vel sæ-
pius in die, donec vomituritio & dolor penitus
cessaverint ; atque etiam, istis symptomatis ces-
santibus, nihilominus ad curationem, confirman-
dam, per aliquot adhuc noctes capiat idem pa-
regoricum in minori dosi cubitum iturus.*

De Fluxu Mensium immodico.

Menstruorum fluxus, naturaliter constitutus, capacitatem testæ ovi anserini implet. Patet autem immodicus ex difficili tolerantia, virium lapsu, inappetentia, cachexia, colore cadaveroso, & pedum intumescencia.

Mittatur sanguis è brachio ad unc. octo ; sequenti manè sumatur *potio purgativa communis*, repetaturque alternis diebus ad duas alias vices ; & noctibus post purgationem *Paregoric. è Syr. de Mecon.* exhibeatur.

Diebus

Diebus à purgatione vacuis sumat sequentia :

R. *Conserv. Rosar. ficc. unc. duas, Trochisc. de terra Lemnia sesquidrachm. Cort. Granator. Corall. rub. præparat. & Boli Armenæ ana scrup. duos, lapid. Hæmatit. Sanguin. Dracon. ana scrup. unum, cum s. q. Syr. Cydonior. Fiat Elect.* de quo sumat ad magnitudinem Nucis moschat. maj. manè & horâ quintâ pomeridianâ, superbibendo sequentis Julapii cochl. sex :

R. *Aq. Germin. Querc. & Plantag. ana unc. tres, aq. Cinnamom. bordeat ; & Syr. de Rosis ficcis ana unc. unam, Sp. Vitriol. q. s. ad gratam aciditatem.*

R. *Fol. Plantag. & Urtic. ana q. s. Contundantur simul, & succus exprimatur, & postea clarificetur ; de quo capiat cochl. quatuor vel quinque sæpiusculè ad libitum.*

Post primam purgationem applicetur Emplastr. seq. regioni Lumborum :

R. *Emplastr. de Minio & ad Hermiam ana part. aq. extendantur super alutam. Fiat Emplastrum regioni Lumborum admovendum.*

De Colica Hyſterica.

EST species quædam, ſeu potiùs inſigne ac valdè uſitatum affectionis Hyſtericæ ſymptoma, cui comitem ſe adjungit dolor circa ſcrobiculum Cordis atrociffimus, uti etiam humorum viridî colore per vomitionem ejeſtio.

Primo, quò ſaburra vitioſorum humorum in ventriculo contentorum minùs impediât Paregorici efficaciam, ſatis magna quantitas *liquoris poſſetici* affatim ingurgitetur, atque iterum per vomitionem rejiciatur, nempe *ejusdem liquoris ſeſqui* cong. quo peracto *Laudan. liquid. gutt. viginti & quinque, in aq. Cinnam. fort. aq. Epidem. vel alius vehiculi unc. una*, propinentur.

In uſu Paregorici hoc notandum, quod eo uſque repetendum eſt, donec ſymptomata omnia penitus ceſſaverint; debitum interea tempus interjiciendo, ut dijudicare valeamus, quid prior doſis effecit, antequam novam ingeramus.

Si ſanguineo temperamento præditus ſit æger, vel ſi antea hoc ſymptomate haud multum infeſtatus fuerit ac viribus fractus; hoc in caſu *sanguis* primùm è brachio detrahendus, antequam vomitorium præſcriptum propinetur.

• Hæc

Hâc ipsâ methodo Clavus hystericus curatur. Sin verò Colica HystERICA diuturnior fuerit per Paroxysmos affligens, tum in eorum intervallis, five extra Paroxysmum, seq. usurpentur:

R. Zedoar. subtiliss. pulv. drachm. unam, cum s. q. Syr. è conditur. Citri. Fiat Bolus, sumendus manè & serò per triginta dies, superbibendo sequentem infusionem :

R. Zedoar. incis. minutim semunc. Vini Canar. unc. quatuor, infundantur frigide per duodecim horas; deinde colentur pro usu; vel Balsam. Peruv. ut in Colica Piëtonum usurpetur.

Quæ de Colica HystERICA hic dicuntur, de Colica etiam Hypochondriaca dicta sunt; ut & hoc diligenter advertendum,

Utriusque affectûs natura sibi vindicare videtur, ut alia atque alia tententur, donec tandem ad illud remedium perventum fuerit, cui quasi genuinè morbus cedit; tametsi ut plurimum Chalybs imprimis confert.

Colica HystERICA tam in hypochondriacis quam hystericis sæpissimè in Icterus desinit; qui sensim sponte suâ faceffit; sin autem longas moras neëtat, exhibeatur Apozema sequens;

R.

R. *Rad. rub. Tinctor. Curcum. ana unc. unam, Chelidon. maj. cum toto & summitat. Centaur. min. ana manipulum unum. Coq. in æqual. partibus Vin. Rhenani & aq. fontan. ad libr. duas. Colatur. dissolv. Syr. de quinque radicibus unc. duas. Misce, fiat Apozema; de quo capiat semilibr. calidè, manè & serò, usquedum convalescerit.*

De Ictero, Colicâ neutiquam prægressâ.

Color flavus in toto corpore, præsertim in oculorum albis est conspicuus, quo quidem colore objecta omnia apparent affectis tincta; corporis pruritus, segnities, & lassitudo; linguæ amaror; vomitus biliosus interdum; singultus; egestio alba; urina crocea, & pannum immersum eodem colore inficiens, morbum indignant.

Exhibeatur *potio purgativa communis*, dein aggre diatur usum sequentium; & durante eorundem usu, *Catharticum præscriptum* quarto quoque die exhibeatur.

R. *Conserv. Absinth. rom. Conserv. flaved. Aurant. ana unc. unam, Angelic. condit. Nuc. moschat. condit. pulv. Ari compos. & Chalyb. cum aceto præparat. ana semunc. extract. Centaur. min. extract.*

extract. Gentian. & Cremor. Tartar. ana drachm. duas, Croc. Anglic. pulv. semidrachm. cum s. q. Syr. de quinque radicibus. Fiat Electuarium; de quo capiat ad magnitud. Nuc. moschat. manè & horâ quintâ pomeridianâ (vel vice Electuarii sumat pilulas chalybeatas) superbibendo post matutinam dosin aquarum mineralium purgantium libr. quatuor; & post pomeridianam dosin Apozemat. in Colica hysterica descript. semilibr.

At si signa Hydropis affuerint, tam manè quàm serò Apozema superbibat.

Si vel his diu continuatis morbus adhuc obstitit, ad aquas ferreas eundem est, quæ ex ipso fonte sunt bibendæ.

Ad præcavendum Abortum.

EAdem præscribenda, ac in fluxu Mensium immodico; omissis solummodò catharsis & succis.

De immodico Lochiorum fluxu.

FLuxum Lochiorum naturalem tria constituunt, sanguis scilicet purus, copiosus, per triduum primum fluens; dehinc sanguis aquosus,

fus, loturæ carniū crassiori similis, per quadri-
duum præter propter durans; hinc postmodum
materia viscosa & mucilaginosā, pauco aut
nullo sanguine permista, per quinque aut se-
ptem dies prodiens, & sic porro ad mensis finem.

Fluxus autem eorum immodicus dijudican-
dus est ex viriū dejectione, animi deliquio,
sanguine grumoso effluente, cibi fastidio, do-
lore in hypochondriis, ventris tensione, pulsu
debili & frequenti, visus obtenebratione, au-
rium tinnitu, & convulsionibus.

Victus incrassans instituat, & potus sequens
addatur :

R. Aq. Plantag. Vin. rubr. ana libr. unam.
Coq. simul ad tertias, & deinde edulcoretur s. q.
Sacchar. albiss. cujus, cum frigescat, capiat semi-
libr. bis vel ter in die.

Interim Julap. aliquod Hystericum (at satis
mite) subinde propinetur, & Nodulus sequens
naribus applicetur :

R. Galban. Assæ fæt. ana. drachm. duas, Ca-
stor. sesquidrachm. sal. Succin. volat il. semidrachm.
Misce, fiat Nodulus. Vel,

R. Sp. salis Ammoniac. drachm. duas; quem
sæpe olfaciat.

De suppressione Lochiorum.

INtumesceat venter; dolor gravativus in venterem, lumbos & inguina occupat; facies rubescit; difficilis est respiratio; perturbantur oculi; rigores, febres acutæ adsunt; animi deliquia; sudores frigidi; pulsationis & ardoris sensus in utero; paralytis in partibus inferioribus; ut & interdum epilepsia.

E vestigio lecto addicatur, & *Emplast. hysteri-*
cum umbilico admoveatur quamprimum; *Elect.*
seq. adhibeatur :

R. Conserv. Absinth. Rom. Rut. ana unc. unam,
Trochisc. de Myrrh. drachm. duas, Castor. Croc.
Anglic. sal. volatil. Sal. Ammoniac. & Assæ fetid.
ana semidrachm. cum s. q. Syr. de quinque radicib.
Fiat Elect. Capiat ad magnitud. Nuc. moschat.
quartâ quâque horâ, superbibendo seq. Julap.
cochl. quatuor vel quinque :

R. Aq. Rutæ unc. quatuor, Bryon. compos. unc.
duas, Sacchar. cand. q. s. Fiat Julap. Vel su-
mat *Trochisc. de Myrrh. scrup. unum*, quartâ quâ-
que horâ.

Si tota prædictorum quantitas consumatur,
& Lochia adhuc supprimantur, *Laudanum* unicâ

saltem vice exhibendum; ut, *Laudan. liquid. gutt. quatuordecim in aq. Bryon. compos. vel Laudan. solid. sesquigr. cum Assæ fœtid. semisrup. in Pilulas duas redactum.*

Si hæc nihil proficiant, tum Enema ex lacte Saccharato, unicâ saltem vice, injiciatur.

De Hydropæ.

FOVEÆ à digitorum impressione in surarum parte inferiori sub noctem conspicuæ, manè evanescentes, hoc malum primùm indicant; maximè si spiritus interim ægrius ducatur; (haud raro tamen foeminæ prægnantes, & quibus catamenia sistuntur, ut & viri ab asthma inveterato derepentè liberati eodem tumore tentantur) pedibus cruribusque ad extremum extensis, in abdomen ruunt aquæ, & ad ultimum capacitatis suæ limen paulatim distendunt, donec tandem in viscera nobiliora impetu ab iis facto æger submergitur. Pro rata qua partes à morbo obsessæ mole augentur, aliæ magis magisque gracilescunt, urgentibus dyspnœâ, urinæ paucitate, et siti intensâ. Viros, ingravescente ætate; foeminas, ubi jam parere desierint, ut plurimum adoritur.

Indicationes curativæ dirigendæ sunt primò

ad

ad aquarum evacuationem; deindè ad instaurandum sanguinis robur, quò novus aquarum proventus præcaveri possit.

R. *Vini albi unc. quatuor, Jalap. subtiliss. pulv. drachm. unam, Zinzib. pulv. semisrup. Syr. de Spin. cervin. unc. unam. Misce, fiat Potio, summenda summo manè, repetendaque singulis vel alternis diebus, pro ratione virium, donec partes affectæ detumuerint. Vel,*

R. *Tamarind. semunc. fol. Senn. drachm. duas, Rhei sescuidrachm. Coq. in f. q. aq. ad. unc. tres, in Colatur. dissolv. Mannæ & Syr. Ros. solut. ana unc. unam, Syr. de Spin. cervin. semunc. Elect. è succ. Rosar. drachm. tres. Misce, fiat Potio, summenda ut supra. Vel,*

R. *Pil. ex duob. scrup. unum, Elater. gr. tria, Ol. chym. Caryophyll. gutt. duas. Fiant Pil. N^o tres. Capiat summo manè, repetanturque ut opus fuerit. Vel,*

R. *Gambogiæ gr. quindecim. Vin. alb. & aq. Cichor. ana sescunc. Syr. de Spin. cervin. semunc. Misce, fiat Potio, summenda ut supra. Vel,*

R. *Cortic. interior. Sambuc. è ligno derasi manipulos*

nipulos tres. Coq. in Aq. & Lact. partibus æq. mistorum libr. duabus ad libr. unam. Colatura capiatur dimidiam partem mane, & alteram sero quotidie, donec convalescat. At hoc remedium nisi in corporibus, quæ facillimè purgativis cedunt, nihil confert.

Circa usum Catharticorum in hoc morbo hæc tria advertenda sunt.

Primo, Utrùm ægri corpus facilè, an verò difficulter Catharticis cedere soleat; cum in iis qui facilè purgantur *Syrup. de Spin. cervin. solus ad unc. unam* exhibitus, aquas sat copiosè eliciat; in illis verò, qui difficulter purgantur, Cathartica supra descripta, utut valida, vix scopum attingant.

Secundo, Cathartica omnia, quæ segniùs operantur, magis officiunt quam prosunt; quàm obrem purgatio paulò fortior & nimia, justo debiliori est præferenda.

Tertio, Aquæ eâ maximâ celeritate exhaustiri debent quam ægri vires ferre queant; ne nimis longa inter purgationes intervalla adhibendo, aquæ demum affatim colligantur.

Est autem ubi medicamenta omnia, qualiscunque demum generis, quæ alvum movent, prorsus omitti possint ac debeant; quoties enim æger constitutione est infirmiori, vel fœmina vaporibus obnoxia, aquarum evacuatio *Diureticis* solùm

folùm committenda, inter quæ ea sunt efficaciffi-
ma, quæ ex *salibus Lixivialibus* fiunt; ut,

R. *Cinerum Geniftæ libr. unam; infundatur fri-
gidè in Vini Rhenan. libr. quatuor. Liquoris per fil-
trationem colati unc. tres* manè, quintâ pomeri-
dianâ, & ferò fingulis diebus exhibeantur, ufque
dum humor evanuerit.

Aquis jam penitùs evacuatis, calefacientia &
corroborantia medicamenta usurpanda; ut,

R. *Rad. Raſhan. Ruſſican. fol. Cochl. hortenf.
Abſinth. vulgar. Salv. ſummitat. Centaur. min. &
Geniſtæ; infundantur in Cereviſia forti, pro potu
ordinario; qui potus incipienti hydropi aliquando
ſine Catharticis ſubvenit. Vel ſequenti utatur:*

R. *Conſerv. Cochl. hortenf. Abſinth. Roman.
ana unc. unam, extract. Gentian. Abſinth. vulgar.
& Centaur. min. ana drachm. tres, cum ſ. q. Syr.
è cortic. Citr. Fiat Eleſtuarium; de quo ſumat
ad quantitatem Nuc. moſchat. maj. manè,
quintâ pomeridianâ, & vèſperi, ſuperbibendo
unc. quatuor ſequentis Infuſionis:*

R. *Rad. Gentian. unc. unam, ſummitat. Geniſt.
Centaur. min. & Abſinth. vulgar. ana manipulum
unum, ſem. Fænicul. & Petroſelini, ana drachm.
duas,*

duas, incisis minutim affunde Vini Rhenani libr. quatuor; stent simul in infusione frigida, & coletur solummodo tempore usûs.

Notandum, cùm ad corroborantium usum deventum fuerit, ægrum nullo modo esse purgandum, tantisper dum sanguinis corroborationi navetur opera.

Quod & per Salium Lixivialium usum omnino observandum, quo quidem tempore pariter corroborare convenit.

R. Rad. Raphan. Rustican. unc. tres, fol. Cochl. hortensf. Absinth. vulg. Salviæ, summitat. Centaur. & Genistæ, ana manipulos tres, Aurant, incis, No tres. Infundantur in Congiis sex Cerevisiæ fortis non lapulatæ, inter fermentandum. Sit pro potu ordinario.

De Gonorrhœa virulenta,

COrripiunt dolor genitalium insolitus, & rotatio testiculorum; in non recutitis macula morbilli æmula glandem occupat: statim à cujus exortu liquor, seminis instar, exstillat, qui quotidie à seminis colore & consistentia recedens flavescit, tandem dilutior ovi vitello; in lue virulentiore virescit, & aqueo humori permiscetur sanguine tincto. Pustula dicta ulcus fit, aphthis, infantum

infantium simile indies latius & profundius depascens, superveniente orificii callo. Verpi non glandis ulcerē, solā Gonorrhœā tentantur, Mox magnus dolor in pene, quoties erigitur; quasi manu transversus fortiter constringeretur, noctu præcipuè urget, dum æger lecto incalescit. Curvatur penis à fræno contracto. Accedit ardor urinæ, inter mingendum vix perceptibilis, sed mictu finito, per urethræ ductum acriter urens, maximè, quā in glandem definit. Carunculae lotii exitum quandoque impediunt; & scroti dolor ac inflammatio nonnunquam superveniunt.

R. *Mass. Pil. Coch. maj. drachm. tres, extract.*
Rud. drachm. unam, Refin. Jalap. & Diagyrid.
ana semidrachm, cum s. q. Opobalsam. Fiant Pilul.
è singulis drachmis sex. Capiat quatuor singulis auroris, donec urinæ ardor & color flavus materiæ seminiformis admodum imminuantur, Postea alternis diebus ad septimanas adhuc duas; ac sub finem bis in septimana, donec humor stillare prorsus cessaverit.

In iis, qui difficulter purgantur, subinde intercalari possit *potio communis purgativa*; cui addantur *Syr. è Spin. cervin & Elect. è Succ. Rosar. ana drachm. duas*; vel, curatione minùs foeliciter succedente, *Turbith. Minerale ad gr. octo*, exhiberi potest,

potest, bis vel ter, diebus quatuor interpositis;
vel vice *Turbith. Mineral.*

R. *Pil. ex. duob. semidrachm. Merc. dulc. scrup. unum, cum s. q. Opobalsam. Fiant Pil. quatuor, summo manè fumendæ.*

Si æger à dicta Catharsi abhorreat, post Pulas primò descriptas, tribus auroris continuis sumptas, tum manè & horâ quintâ pomeridianâ, quotidie injiciatur *Clyster* sequens; nisi quod semel aut bis in hebdomade, omisso *Clystere, Cathartic.* imperandum.

R. *Elect. è succ. Rosar. drachm. sex, Terebinth. Venet. vitello Ovi solut. semunc. dissolvantur in aq. hord. libr. unam. Colatur. adde Syrup. Vio- lar. unc. duas. Misce, fiat Clyster.*

Singulis noctibus capiat *Opobalsam. vel Balsam. è Mech. gutt. viginti & quinque Sacch. frustulo exceptas.* Hujus defectu, *Terebinth. Cypr.* ad quantitatem *Avellanæ* substitui possit.

Sit pro potu hydrogala; at *Cerevisia tenuis* in pastibus.

Vel sequentem methodum aggrediatur:

R. *Pil. ex duobus semidrachm. Opobalsam. gutt. tres. Fiant Pil. N° tres. Capiat horâ quartâ matutinâ, superdormiendo, repetanturque alternis diebus, vel tertiâ quâque die.*

Diebus

Diebus à purgatione vacuis, injiciatur manè & horâ quintâ pomeridianâ Clyster supra descriptus.

Procedente curatione (quâcunque eâ demum methodo tentetur) sanguis sub medium curationis semel vel bis mittatur, & diæta refrigerans, & incrassans præscribatur, & medicamenta iisdem virtutibus pollentia; qualia sunt *Hydrogala, Emulsiones ex seminib. frigid. &c.*

Si Penis tumore afficiatur,

R. Rad. *Althææ, Liliæ. ana fescunc. fol. Malv. Verbas. Sambuc. Hyoscyam. flor. Chamæmel. Melilot. ana manipulum unum, sem. Lin.*, *Fæugr. ana semunc. Coq. f. q. aq. font. & fiat fots*, parti affectæ admovendus, per horæ unius spatium, bis vel ter in die.

Peractâ fomentatione, perungatur pars affecta *ol. sem. Lin. rec. extract. dein Emplast. è mucilag. ginibus alutæ agnæ inductum* labiis præputii tumidis circumponatur.

Si Ulcus in præputii labiis, vel in subjecta Glande, hæreat; tum sequens Linimentum præscribatur:

R. *Unguent. Basilic. drachm. sex, Unguent. Nicotian. drachm. duas. Præcipitat. aq. Rosar. loti & optime levigat. semidrachm. Miscæ, fiat Linimen-*

L

tum;

tum ; quo lintei rasura imbuatur, & ulcusculo admoveatur semper post fotûs præscripti usunt.

Si scrotum tumore afficiatur, statim *sanguis* è brachio extrahatur, atque bis in die fotus præscriptus parti affectæ admoveatur, singul. fotibus addendo *Sp. Vin. Gallic. cochl. unum vel alterum*, vel *Cataplasma ex Oxycrato & farina fabarum* ejus loco applicandum.

Catharticis interim & refrigerantibus modò descriptis introsumptis utendum est.

De Lue Venerea.

UBi aut à Gonorrhœæ mora, aut indebito astringentium usu, labes sanguini imprimitur, exoritur Lues. Comparent in inguine bubones ; in capite dolores & artubus, articulorum interstitiis, noctu præcipuè invadentes in lecto calidos ; crustulæ & porrigines in variis corporis partibus, quæ ad instar favi flavescent. Quo magis scabies diffunditur, tanto minus æger discruciat. In cranio, tibiis brachiisque exostoses, ossium inflammatio & caries ; ulcera phagædenica in variis partibus ; sed fauces ut plurimum primò aggredientia, quæ sensim per palatum in nasi cartilaginem propagata mox eam absument, ita ut fulcro destitutus nasus plane concidat. Ulceribus, carie & dolore in-

dies

dies exacerbatis, pereunt per vices membra ;
lacerum donec cadaver, & jam superis grave,
humo condatur.

R. *Axung. Porc. unc. duas, Mercur. crud. unc. unam. Misce, fiat Linimentum,* in tres equales partes dividendum ; quarum unâ brachiâ, crura & tibias, ad tres noctes continuas manibus suis æger perungat.

Si intra tres dies post ultimam inunctionem salivatio haud procedat, tum *gr. octo Turbith. mineral. in Conserv. Rosar. rubr. exhibeantur ;* aut corporibus minus robustis, *Mercur. dulc. scrup. unum.* Sed si salivatio jam incepta priùs elan- guescat, quàm symptomata penitus disparue- rint, extimulanda subindè est eâdem dosi *Mer- cur. dulc.*

Ptyalismus ita moderari debet, ut *libr. quatuor Nycthemeri* spatio expuat, aut circiter.

Si justo altiùs exurgat Ptyalismus, cum in- flammatione nimia, atque id genus symptoma- tis ingruentibus, aliquantulum reprimendus est medicamentis Catharticis, donec debitum gra- dum attingat.

Quamprimum symptomata cessaverint, sta- tim immutentur indusium & tori lintea ; at sint ea, quæ priùs usurpata fuerint.

Si Diarrhœa supervenerit (quod plerumque accidit antequam salivatio bene assurgat) tunc sistenda est usu *Laudan. liquid.* ita dosim augendo atque repetendo, ut debitum opus absolvat.

Si os exulceretur, *aq. Ros. Damascen. vel lacta aq. permisto*, vel *seq. Decocti* idem colluatur:

R. Rad. Alth. Hord. mundat. ana unc. unam, sem. Cydonior. semunc. Coq. s. q. aq. ad libr. duas. Misce, fiat Gargarisma; quo sæpius utatur.

Diætâ & reliquum ægri regimen, eadem ac in Cartharsi imperanda; nisi quòd primis aliquot diebus liquore possético, jusculis avenac. hordeac. ac cerevisiâ tenui tepefactâ nutriatur.

His omnibus ritè peractis (etiamsi symptomata omnia evanuerint, ac subindè morbus penitus profligari videatur) quo minùs recidivam postliminio patiatur, ægro semel in septimana per quatuor vel sex vices, *Mercur. dulc. scrup. unum* exhibendus, utcunque bene se habeat, & etiamsi jam domo egrediatur.

De Fluore albo.

QUod effluit, modò album, modò pallidum, flavum, viride aut subnigrum; modò acre & erodens; tetrum quandoque & graveolens;

olens; decoloratur facies; dolet spina dorſi; proſternitur appetentia; oculi pedesque intumescunt.

Mittatur ſanguis, è brachio ad unc. octo.

R. *Pil. Coch. maj. ſcrup. duos, Caſtor. gr. duo, Baſam. Peruv. gutt. tres. Fiant Pil. N° quatuor.* Capiat horâ quartâ matutinâ, ſuperdormiendo; repetanturque per duas alias vices, interponendo diem unum vel alterum, pro ratione virium.

R. *Aq. Rut. unc. quatuor, aq. Bryon. comp. unc. duas, Sacchar. cryſtal. q. ſ. Fiat Julapium.* Capiat cochl. tria vel quatuor in omni ſanguore; deinde aggrediatur uſum ſequentium:

R. *Theriac. Audromac. ſeſcunc. Conſerv. flaved. Aurant. unc. unam, Diaſcord. ſemunc. Zinzib. condit. & Nuc. moſchat. condit. ana drachm. tres, pulv. è chel. Cancr. comp. ſeſquidrachm. cort. exterior. Granat. rad. Angelic. Hiſpan. Corall. rubr. præparat. & Trochiſc. de terra Lemnia ana drachm. unam, Boli Armen. ſcrup. duos, Gumm. Arabic. ſemidrachm. cum ſ. q. Syr. de Roſis ſiccis. Fiat Electuar. de quo ſumat ad magnitud. Nuc. moſchat. maj. manè, horâ quintâ pomeridianâ, & nocte, per menſem integrum; ſuperbibendo ſequent. infuſionis cochl. ſex:*

R. *Rad.*

R. Rad. Enul. campan. Imperator. Angelic.
Calam. Aromat. ana semunc. fol. Absinth. Ro-
man. Marrub. alb. Centaur. min. Calamentb.
vulgar. Salv. sicc. ana manipulum unum, Bac.
Junip. unc. unam; incidantur minutim, & infun-
dantur in vini Canarini libr. quatuor; stent simul
in infusione frigida; coletur tantummodo tem-
pore usûs.

Vescatur cibis eupeptis, & absteineat ab usu
olerum & fructuum qualiumcunque, & singul.
passibus bibat vinum Hispanicum.

De Diabete.

SUCCI sanguini illati per vias urinarias crudi
& inconcocti exitum sibi quærunt; unde
sensim labefactantur vires; colliquescit corpus,
& quasi substantia ejus per hanc cloacam exi-
nanitur cum siti; ardore viscerum; lumborum
coxarumque intumescentiâ; & salivæ spumose
expuitione crebrâ.

Eadem præscribenda sunt, quæ in Fluore al-
bo, omissis solummodò Venæsectione & Ca-
tharfi.

De

De Doloze Hæmorrhoidum.

INtensiffimus inter excernendum dolor excruciat, & excrementi superficies cruore conſpergitur: Nonnunquam tumores verrucis ſimiles in ſphinctere deliteſcunt, vel in margine ani apparent.

Mittatur ſanguis è brachio dextro ad unc. decem.

R. Sem. Melon. Pepon. ana ſemunc. ſem. Papav. alb. drachm. duas, Amygd. dulc. excorticat. Noſe quinque. Contundantur in mortario marmoreo, ſenſim affundendo aq. bord. ſeſquialibr. aq. Roſar. drachm. duas, Sacchar. albiff. q. ſ. Fiat ſ. a. Emulſio. Capiat unc. tres ſæpiuſcule.

R. Flor. Sulphuris, Pulv. Glycyrrhiz. Salviæ ana drachm. unam, cum ſ. q. Baſam. Lucatel. Fiant Pil. è ſing. drachm. ſex. Capiat tres ter in die, ſuperbibendo Emulſ. præſcript. cochl. ſex.

R. Aq. Spermat. Ranar. unc. quatuor; in qua diſſolv. Lythargyr. drachm. duas, Opii ſcrup. unum. Fiat Mixtur. cujus tantillo Linteum maderactum parti affectæ applicetur; vel, ſi tumor

mor intus lateat, cochl. tria ejusdem mixtura modo Clysteris injiciantur.

Pro potu ordinario bibat aquam cum lacte coctam, vel aquam hordei; & à carnis usu abstineat. Singulis noctibus fumat *Diacodium*.

De Fluxu Hæmorrhoidum immodico.

Innotescit ex viribus prostratis, copia & diurnitate sanguinis excreti, sædo corporis colore, ad citrinum (ut in Ictero) vergente. Succedit Cachexia, & deinde Hydrops.

Eadem conferunt, quæ in fluxu mensium immodico, omisâ solummodò Catharsi.

De Epilepsia Puerorum.

Vel primo mense aggreditur à frequentibus nimis alvi dejectionibus, (quo in casu *Diascordium ad quantitatem grani piperis in aq. Saxifrag. aut lacte materno solutum*, & exhibitum præstantissimum est remedium.) Vel circa dentitionis tempus, à septimo ad decimum mensem, tussi comitata est, aut (quod multo deterius) vomitu & diarrhœâ, viridia (ut solent hysteriæ) egerente infante. Quandoque improvise occupat

occupat paroxysmus, os oculosque distorquens, nigredine vultum perfundens, & artus varios convellens; quandoque præsentitur ex digitorum in pugnum contractione, & ex stabili & insolitâ oculorum orbitarum immobilitate. Nunc seriùs nunc ocyùs se proripiunt paroxysmi, certâ subinde periodo, vago alias insultu revertentes; sed, appetente morte, à tergo se invicem premunt: Si quando inducias dent, in soporem proclives sunt infantes, donec à novo resuscitentur insultu.

Applicetur *Emplast. Epispastic.* cervici quamprimum.

R. *Aq. Epilept. Lang. drachm. tres, Laudan. liquid. gutt. unam, vel duas, vel plures, pro ratione ætatis, Syr. Pæon. drachm. unam. Misce, fiat Haustus, sumendus quamprimum.*

R. *Aq. Rutæ unc. tres, aq. Epilep. Lang. & aq. Bryon. comp. ana unc. unam, Syr. Caryophyll. semunc. Misce, fiat Julap. Capiat cochl. unum singulis horis, si haustus præscriptus paroxysmum non fugaverit.*

De Rachitide.

IN Rachitide adfunt partium laxitas & molities, debilitas & languor, ignavia & torpor, & inæqualis earundem nutritio, viz. caput iusto majus; facies plenior & floridior; partes carnosæ infra caput emaciantur; nodis protuberant articuli; maximè carpi, paulò minus tali; tument & extremitates costarum; ossa incurvantur, præcipuè tibiæ & fibulæ; hinc ulnæ & radii; aliquando femoris & humeri, decurvantur etiam ossa; dentes tardè & molestè erumpunt, vacillant, nigrescunt, & frustulatim excidunt; pectus à lateribus angustum, antèrius acuminatum, abdominis repletio, & hypochondriorum tensio; tussis & pulmonum vitia lacefunt; lateralis decubitus modò dextri, modò finistri averfatio.

R. *Fol. Absinth. vulgar. Centaur. minor. Mar-
rub. alb. Chamædryos, Scordii, Calamenth. vulg.
Parthen. Saxifrag. pratens. Hyper. Virg. aureæ,
Serpill. Menth. Salv. Rutæ, Card. Benedict. Puleg.
Abrotan. Chamæmel. Tanacet. Lilior. convall.
omnium rec. collect. & incis. ana manipulum unum,
Axung. porcin. libr. quatuor, Sev. Ovin. & Vin.
claret. ana libr. duas; macerentur in olla fœtili su-*

per

per cineres calidos per horas duodecim; deinde ebulliant ad humiditatis consumptionem; & postea colentur, ut fiat Linimentum; quo venter & hypochondria illinantur manè & serò, ut etiam & artus hoc malo affecti, per triginta vel quadraginta dies, vel donec convaluerit.

R. Singulor. ingredient. præscript. ana manipulos duos; infundantur frigidè in Cerevisiæ non lupulat. Cong. quatuor, pro potu.

In Tumoribus Infantum ventres occupantibus ab evacuationibus nimis procedentibus, Sanguis & Viscera *herbis corroborantibus* confortentur, ut in Rachitide vera; nisi quod axillæ etiam utræque inungantur, at non artus.

De Febris à Dentitione ortis.

R. S^p. Cor. Cervi gutt. duas, vel tres, vel quatuor, pro ratione ætatis, in cochl. uno, vel altero aq. Cerasor. nigr. vel Julap. alterius appropriati exhibeantur quartâ quâque horâ, ad vices quatuor vel sex.

De Febre hectica Infantum.

Sine inſigne calore languent cum appetitûs dejectione, artus & truncus corporis emaciantur.

Rhabarb. incifi drachm. duas in lagenam vitream, Cereviſiæ tenuis libr. duarum capacem, immittantur pro potu ordinario.

Epoto hoc liquore, aliæ libr. duæ eidem Rhabarb. ſuperaffundantur ad tertiam vicem.

Si verò potus vi Catharticâ ſaturatius imprægnetur, tum libr. unâ epotâ alteri Cereviſiæ mox adjiciatur,

De Tuffi Puerorum Convulſiva.

Phlebotomiâ & repetitâ Catharſi, eâque ſolâ, expugnatur hæc tuffis, malum aliàs pertinaciffimum, & fere inſuperabile; ſed leniora tantum cathartica hic conveniunt, eaque cochleatim ingerenda ſunt, pro ratione ætatis,

De Hæmorrhagia Narium.

Dolor & calor sinciput lancinant.

Sanguis è brachio frequenter extrahatur; victus ratio refrigerans & incrassans injungatur; *Julap.* refriger. & incrassans, cum *Emulsionibus* refrigerantibus, præscribantur.

Singulis diebus injiciatur *Enema refrigerans*, atque omni nocte *Paregoric. ex Syrup. de Mecon.* exhibeatur, & semel vel bis *Potio purgativa commun.* præscribatur.

Lintea quadruplicata immersa aq. frigida, in qua sal. Prunell. dissolvatur; & postea leviter expressa admoveantur nuchæ, & utrinque cervici sæpius in die.

Post Evacuationes, liquor sequens applicetur:

R. *Vitriol. Hungaric. & Alum. ana unc. unam, Phlegmat. Vitriol. semilibr. Coq. tamdiu, donec omnia fuerint dissoluta; liquorem frigesactum filtra, & à Crystallis subinde natis separa, liquori residuo adde ol. Vitrioli duodecimam partem. Vel potius,*

R. *Aq. Plantag. unc. tres, bol. Armen. subtiliss. pulver. semunc. probè misceantur; Turunda ex lin-*

teo

teo raso liquore hoc humectata nari, ex quo sanguis stillat, indatur, per dies duos isthic relinquenda.

Hoc minus succedente, *Vitriol. Rom. aq. commun. dissolvatur, qua Turunda imbuta nari indatur; liquore etiam hoc linteamina imbuta, & applicata sanguinem sistunt, si ex parte externa diffluat.*

De Chlorosi.

AD sunt vultus & totius corporis decoloratio; intumescencia in facie, palpebris & malleolis; gravitas totius corporis; crurum ac pedum tensiva lassitudo; respiratio difficilis; cordis palpitatio; capitis dolor; pulsus febrilis; somnolentia; pica, & mensium suppressio.

Sumat *Pilulas Chalybeatas*, vel *pulv. Chalybeatum* in affectione hysterica præscript. plus minus pro ratione ætatis, superbibendo haustum vini cujuslibet ad libitum, vel *Infusion. corroborant. cum rad. Angelic.* ibidem descriptam. Si ægra non valde debilis fuerit, purgetur semel, vel bis, ante præscriptorum usum.

De Suppressionē Mensium.

Cibum fastidiunt mulierculæ; fœdus faciei color est; gravitas totius corporis; dolores scapulis, lumborum, crurum & imi ventris; pedum tumores infestant.

Eadem præscribenda ac in Hysterica affectione; at si iisdem remediis affectus non cesserit, tum sequentia sunt præscribenda:

Singulis auroris, & quartâ pomeridianâ, sumat *Jalap Hysteric. sine Castor. cochl. quinque, infilland. Sp. Cor. Cervi gutt. duodecim.* Singulis noctibus sumat cubitum itura *Trochisc. de Myr. scrup. unum, cum Syr. de Artemis. in formam Boli vel Pil. redact.*

De Vomitu sanguinis, vel etiam de Hæmoptoë.

IN Hæmoptoë dolor & calor pectus obsident, cum debilitate quadam.

Mittatur sanguis ex brachio dextro ad unc. decem. Sequenti mane sumat *Potionem purgativ. commun. & eadem nocte Paregoric. ex unc. tribus, aq. Cerasor. nigr. & Syr. de Mecon. unc. una.*

Postea aggrediatur usum sequentium:

R. Bol.

R. *Bol. Armen. unc. unam, pulv. Radic. Symphyt. drachm. duas, Ter. sigillat. Lapid. hæmatit. & Sang. Dracon. ana drachm. unum, Sacchar. albiss. ad pondus omnium. Misce, fiat pulvis subtilissimus; cujus cap. drachm. unum manè, quintà pomeridiânâ, & nocte, superbibendo sequent. Apozemat. unc. quatuor :*

R. *Fol. Plantag. Rubi Sylvestris, & Millefol. ana manipulum unum. Coq. f. q. aq. ad sesqui-libr. in Colatura dissolv. Syrup. de Symphyt. unc. duas. Misce, fiat Apozema. Vel cap. cochl. sex sequent. Tincturæ :*

R. *Flor. Ros. rubr. drachm. sex, Cort. intern. Querc. semunc. sem. Plantag. parùm contus. drachm. tres, aq. font. libr. duas, Sp. Vitriol. q. f. ad levem assiditatem; infundantur in vase clauso, calore leni, per quatuor horas; Colatur. adde aq. Cinnamon. hordeat. unc. tres, Sacchar. albiss. f. q. ut fiat Tinctura gustui grata.*

Si ab usu Pulveris abhorreat, utatur *Electuario* in fluxu mensium immodico præscripto.

Enema quotidie injiciatur, & *Diacodium* horâ somni propinetur.

Phlebotomia insuper semel, bis, vel ter (ut opus fuerit) reiteretur, diebus aliquot interpositis ;

tis; & semel iterum, si res postulet, repetatur potio purgativa.

Diæta incrassans & refrigerans observanda.

De Punctura Tendinis.

Humor aqueus, vel ichor quidam, ex orificio venæ incisæ jugiter distillat.

R. Rad. Lilior. alb. in Lacte vaccin. ad teneritud. coct. & contus. unc. quatuor, Farin. sem. Lin. & Avenæ ana unc. tres. Coq. ad Cataplasmatidis consistentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuere: applicetur parti affectæ manè & serò.

De Ambustis.

Foveatur pars affecta linteis Sp. Vini imbutis, usque dum evanescat dolor; ac deinceps de novo imbuatur linteum, quod ter vel quater in die, parti affectæ applicetur.

De Mania communi.

A Nimis exaltata & vivida sanguinis crasioritur. Est & alia mania species febres intermittentes diuturniores excipiens, in stultitiam

tiam tandem degenerans, producta quidem à debilitate & vapiditate sanguinis, à diutina fermentatione. Præscribantur itaque *Cardiaca* generosiora, viz. *Theriac. Andromach. Electuar. de Ovo, pulv. Comitiff. pulv. Gualt. Rawleigh, in aq. Epidem. Theriacal. vel alia*; & diæta instituatur analeptica.

In junioribus mittatur *sanguis* è brachio ad unc. octo vel novem, bis vel ter, diebus tribus inter singulas Venæsectiones interpositis. Tum semel extrahatur sanguis è venis jugularibus. Postea tota curatio innitatur sequenti *Cathartico*, quod sumat tertiâ vel quartâ quâque die, donec convaluerit: hoc interim observando, quod cum octies vel decies purgatus fuerit æger, exhibitio Cathartici ad septimanam unam vel alteram omittatur.

R. *Pharmac. domestic. (i. e. rad. Bryon. alb.) pulv. unc. unam, Lactis vaccin. unc. quatuor. Vel,*

R. *Ejusdem semunc. vel drachm. sex, Vin. alb. unc. quatuor; infundantur per noctem; in colatura dissolv. Syr. Violar. unc. una. Misce, fiat Potio. Vel,*

R. *Gambogii gr. quatuordecim, aq. Cerasor. nigr. unc. tres, Syr. Caryophyll. semunc. Fiat Potio.*

De

De Contusionibus.

Mittatur *sanguis* è brachio lateris magis affecti ad unc. decem; sequenti manè exhibeatur *Potio communis purgativ.* ac deinceps eodem modo Venæsectio & purgatio alternatim repetantur, donec æger convaluerit. Interim toto decursu, si internæ partes lædantur, sequentia præscribantur:

R. *Decoct. Pectoral. sesquilibr. Syr. Violar. Cap. Ven. ana unc. duas. Fiat Apozema.* Capiat semilibr. ter in die. Item *ol. Amygd. dulc. rac. cochl. unum*, sæpius propinetur.

R. *Ol. Amygd. dulc. Unguent. Dialth. & Pomat. ana unc. unam. Misce, fiat Linimentum;* quo ungatur pars læsa manè & serò, superimponendo *fol. Brassicæ.*

. *De Furfure, sive Porrigine capitis.*

Potio purgans communis bis propinetur; dein,

R. *Ol. Amygd. amarar. & Laurini, Cinerum fol. Abrotani ana unc. unam; misceantur probè, &*

fiat Linimentum; quo inungatur totum caput singulis matutinis, diligenter infricando, & postea superimponendo vesicam suillam.

At primùm abradatur totum capillitium, & postea defricentur squamulæ, sensim singulis auroris, prout decidere pronæ fuerint.

De morfu Canis rabidi.

POst quadraginta dies, aut plures, melancholica adsunt symptomata; febris, sitis, hydrophobia, & tandem partium extremarum convulsio.

R. *Sp. Vin. optimè reëtificat. unc. quatuor, Theriac. Andromach. unc. unam. Fiat Mixturâ;* qua illinatur pars læsa ter in die, superimponendo linteam eâdem mixturâ imbutum.

De Ulcere Vesicæ.

PUs graveolens, aut sanguis, nonnunquam squamulæ seu pelliculæ membranaceæ ac veluti furfuraceæ crustulæ (sin in renibus hæreat ulcus, carunculæ minutulæ, aliquando crassiores) unâ cum urina excernuntur; perpetua dysuria

dysuria & continuus earum partium dolor instant. Renibus autem affectis ulcere, dilucida dysuriæ, & doloris dantur intervalla; pus etiam excretum copiosus est, album, leve & minimè foetidum; lacti similis profunditur urina: & longè post mictionem pus ab eo separatim in fundo residet.

R. *Emplast. Flor. Unguent. dict. sesquidrachm.*
Fiant Pil. N° novem. Capiat tres horis medicinalibus, superbibendo sequentis aq. cochl. sex:

R. *Rad. Fœnicul. Consol. Aristoloch. & Caryo-*
phyll. ana unc. tres, fol. Agrimon. Hyper. Bugul.
Sanicul. Plantag. ana manipulos sex; incidantur
minutim, & distillantur in Vini alb. & Lact. ana
libr. quatuor, & eliciantur solummodo libr. quatuor
pro usu.

R: *Pulv. rad. Consolid. maj. & Gumm. Arab.*
ana unc. unam, Sacchar. Penid. unc. duas. Fiat
Pulv. Capiat cochl. unam bis in die.

De

De Asthmate inveterato in iis, qui sanguineo temperamento præditi sunt.

Dividitur in tres species; *Dyspnœam*, quæ difficilis est respiratio, in qua crebrior densiorquæ est spiritûs tractio, ex infarctu pulmonum sine stertore oriunda: *Asthma*, ubi frequens & magna respiratio, in qua diaphragma, musculi intercostales, tum etiam abdominis, violenter moventur, cum stertore & sibilo: in priore specie substantia pulmonum, in posteriore bronchia oppilantur: et *Orthopnœam*, quæ est maxima spirandi difficultas, sub qua ægrotañtes non nisi sedentes, & erectâ cervice respirare possunt: musculi etiam pectoris & scapularum vehementer exagitantur.

Mittatur *sanguis* è brachio dextro ad unc. decem. Die sequenti sumat *Potionem purgativam communem*; quæ repetatur tertiâ quâque die, per duas alias vices.

Diebus à Purgatione vacuis sumat sequentia:

R. *Sem. Anis. subtiliss. pulv. drachm. duas, cum s. q. Balsam. Lucatell. Fiant Pil. ex singulis drachmis, sex.* Capiat tres manè, & quintâ pomeridianâ, superbibendo *decocti Amari sine purgantibus* unc. quatuor calidè.

Si Symptomata adhuc maneant, repetatur de novo integer Processus.

De Paralyfi.

Sensus & Motus in partibus quæ afficiuntur, vel simul, vel alterutra tantum facultas aut prorsus extinguitur aut vitiatur.

Sumat *Pil. Coch. min. scrup. duos*, alternis matutinis per sex vices; deinde capiat ter in die per triginta dies *Electuar. Antiscorbutic. drachm. duas*, superbibendo *aq. Antiscorbutic. cochl. sex.* Vide in Scorbuto.

R. *Unguent. Nervin. unc. tres, Sp. Lavendul. comp. & Sp. Coch. hortens. ana fescunc. Misce,* & inungantur partes affectæ, ut spina dorfi, &c. manè & serò.

Pleraque præscriptorum, utut curationi scorbuti solum destinari videantur; attamen cum humores crudos, ac fixos, volatilifare præ aliis apta nata sunt, in Paralyfi etiam conveniunt.

De

De Tussi & Phthisi.

TUssis per se patet. Phthisis autem invadit ab ætatis anno octodecim ad triginta & quinque. Extenuatur totum corpus. Febris molestat hectica, à cibo invalescens, (quæ ex celeritate pulsus, rubedinéque genarum dignoscitur); materia per Tussim excreta cruenta est aut purulenta; in ignem coniecta, tetrum spirat odorem, & immissa in vas aquâ repletum, fundum petit. Sudores nocturni superveniunt; livescunt tandem genæ; facies pallet, exacuuntur nares; temporum quòque collapsus; unguum incurvatio; capillorum defluxio; & alvi profluvium colliquativum, mortem statim subsequeturam denunciant.

Si Tussis recens fuerit, & nondum febrim, aut alia signa Peripneumoniam notham comitantia, accersiverit; vel si à Pleuritide, aut Peripneumoniâ, ob neglectam sufficientem Phlebotomiam, malè curatis eadem nequaquam orta fuerit; satis erit, ut æger per dies aliquot ab usu Vini & Carnis abstineat; & his similibus remediis ad libitum utatur.

*Balsamum sulphuris Anisatum ad gutt. decem,
cochl. uno Sacchar. crystall. instillatum, bis vel
ter*

ter in die devoretur; ut etiam *Tabellar. sequent.* quas secum æger continuò portet, unam frequenter assumat.

R. *Sacchar. cand. sesquilibr. Coq. f. q. aq. font. usque dum adhaerescat extremis digitorum; tum adde pulv. Glycyrrhizæ, Enul. campan. sem. Anis. & Angelic. ana semunc. pulv. Irid. Florentin. Sulphur. ana drachm. duas, ol. Chem. Anisi scrup. duos. Fiant s. a. Tabellæ domesticæ vocand. atque hoc interim Eclegmate utatur.*

R. *Ol. Amygd. dulc. unc. duas, Syr. Cap. Ven. Violac. ana unc. unam, Sacchar. cand. q. f. Fiat Lochoch. de quo sæpius lambat bacillo Glycyrrhizæ, quando Tussis urget.*

In defluxione tenui *Eclegmata incrassantia* exhiberi poterint.

Sin verò Tussis his remediis haud cessaret, (præcipuè autem si febrim comitem habeat, vel si à Peripnuemonia aut Pleuritide originem ducat), tum ineptum fuerit pectoralibus fidere; sed Venæsectione & Catharsi debellanda est, ut in methodo, quæ in curatione Peripnuemoniæ nothæ describitur.

Verum enimverò cùm, his omnibus non obstantibus, Tussis non modò non curationi cesse-

rit, sed & diuturnâ Pulmonum concussione eos adeò debilitaverit, ut Phthisis tandem subingressa fuerit, tum hâc methodo procedendum.

R. *Balsam. Peruv. gutt. decem; insillentur cochl. uno Syr. Hederæ. terrestris: vel si id minus gratum fuerit ægro, cochl. uno Sacchar. crystal.* Capiat ter in die, superbibendo *Decocti amari sine purgantib. unc. quatuor*, vel (si idem ventrem moverit) *unc. tres.*

Sed omnibus aliis (quotquot adhuc inventa sunt) *Equitatio* ad fatis longa & diutina itinera facilè palmam præripit, hoc observando, ut si æger juvenilem ætatem prætergressus fuerit, plus temporis huic exercitio impendere debet, quàm si puer aut juvenis esset: & sanè haud multò certiùs *Cortex Peruv.* Febri intermittenti, quàm in hac ætate *Equitatio Pthisi* medetur.

De Scorbuto.

ADsunt spontaneæ lassitudines; corporis gravitas; dyspnœa, præcipuè ex motu corporis; gingivarum putrefactio; oris graveolentia; sanguinis è naribus crebra eruptio; ambulandi difficultas; crurum nunc intumescencia, nunc extenuatio, in iisdem perpetuo maculæ lividæ,

vidæ, plumbeæ, flavæ, aut violaceæ; faciei color plerumque ex pallido fuscus.

Extrahatur *sanguis* è brachio ad unc. octo, nisi signa Hydropis adfuerint. Seq. manè exhibeatur *Potio purgat. communis*; quæ repetatur tertiâ quâque die per duas alias vices.

Diebus à purgatione vacuis, ut etiam postea, per mensem unum vel alterum sumat sequentia :

R. *Conserv. Coch. hortens. unc. duas, Conserv. Lajul. unc. unam, pulv. Ari compos. drachm. sex, cum s. q. Syr. Aurantior. Fiat Eleſtuar. de quo capiat ad magnitud. Nuc. moschat. maj. manè, quintâ pomeridianâ, & nocte, superbibendo aq. Raphan. compos. cochl. sex; vel sequentis :*

R. *Rad. Raphan. Rustican. raspat. libr. duas, rad. Ari libr. unam, fol. Coch. hort. manipulos duodecim, fol. Menth. Salv. Nasturt. aquat. & Beccabung. ana manipulos sex, sem. Coch. hort. parum contus. semilibr. Nuc. moschat. semunc. Vin. alb. libr. sex; destillentur organis communibus, & eliciantur solummodo libr. sex pro usu.*

Vel *Folia rec. Coch. hortens. per se destillentur pro usu dicto.*

Porro sequens cerevisia sit pro potu ordinario.

R. Rad. Raphan. Rustican. recentis incis-
drachm. duas, fol. Coch. hortens. N^o duodecim,
Passular. enucleat. N^o sex, Aurantii cum toto in-
cisi dimidium, in Lageram vitream libr. duarum.
Cerevisiæ tenuis capacem, subere mox probe obtu-
randam, immittantur.

In hunc modum parentur eodem tempore sex
Lagenæ pro usu; & post aliquot dies sex aliæ,
antequam priores exhauriantur, & sic deinceps.
Vel,

Vice hujus Cerevisiæ seq. *Misturæ cochl. tria
vel quatuor*, immisceri poterint, singulis haustibus
potûs communis.

R. Rad. Raphan. Rustican. & sem. Coch. bor-
tens. ana semunc. fol. Coch. hortens. manipulos duos,
pulpam unius Aurant. Contundantur simul in mor-
tar. marm. sensim adfundendo Vin. alb. semilibr.
Coletur cum levi expressione, & reponatur pro
usu.

Eadem remedia, Phlebotomiâ & Catharsi o-
missis, in Rheumatismo scorbutico, five Hys-
terico, valde profunt.

De Podagra.

EXeunte Januario, aut incipiente Febuario,
ingruit horâ ferè secundâ matutinâ, dolore
pollicem

pollicem pedis ut plurimum occupante, quandoque verò calcaneum, suram aut talum; mox sequitur rigor, cum horrore, & febricitatione aliquali, dolor gradatim intenditur, & pari passu rigor atque horror recedunt; idque in singulas horas, donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit, nunc tensionem violentam, nunc morsum canis rodentis, quandoque pressuram, & coarctationem exprimens: hinc præ exquisito dolore, nec linteorum superincumbentium pondus, nec cubiculi à fortiori ambulatione concussionem ferre Podagricus valeat: dolor non sedatur, nisi ante horam secundam, tertiamve matutinam, (decurso scilicet nycthemeri spatio à primo appulsu), & jam leni dolore perfusus æger somno concedit; à quo e-vigilans, dolore multum imminuto, partem affectam tumore recenter occupatam cernit. Sequenti die, fortè etiam ad biduum, triduumve dolet nonnihil pars affecta, idque vehementius advesperacente die; levatur autem sub galli cantu. Intra paucos dies alter pes eodem dolore torquetur. Postquam utrumque pedem exercuerit dolor, qui sequuntur Paroxyismi abnormes sunt, tum quoad tempus invasionis, tum durationem; atque ex serie horum paroxysmorum, constat Paroxysmus, qui dicitur *Podagrica*, diuturnior breviorve pro ægri ætate. In
iis,

iis, qui vegetiores sunt, & quos Podagra rarius invasit, diebus sæpe quatuordecim; in senioribus, atque iis quos sæpius afflixit, duobus mensibus ferè definit; iis verò qui vel annis, vel diuturniore morbi mora fracti sunt, non prius valedicit, quàm ætas jam adultior eam fugaverit.

Ad quatuordecim primos dies urina coloratior est, cum sedimento rubro, & quasi arenulis referto, alvus ferè constipata est. *Appetitus* prostratio, rigor totius corporis sub vesperam, integrum Paroxysmum comitantur: recedentem Paroxysmum excipit pedis affecti inter. digitos pruritus, vix ferendus; unde decidunt furfures, & pedes desquamantur.

Haftenus dolor pedibus tantum fuerit infectus; cum verò vel ab indebita medicatione turbatur Podagra, vel ob diuturnam morbi pertinaciam, corporis substantia quasi in morbi fomitem pervertitur; jam manus, carpos, cubitos, genua, aliasque regiones occupat; quandoque unum, pluresve digitos distorquens fasciculo radicum pastinacæ similes eos reddit, motu paulatim privans; tandemque concreciones, circa articulorum ligamenta, tophaceas generans, cretam, vel oculos cancrorum æmulantes: nonnunquam in cubitis tumorem subal-
bum ciet, ferè ad ovi magnitudinem, qui sen-

• fim

sim inflammatur, cum rubore; nonnunquam femur occupans sensum exhibet quasi ingentis ponderis appensi, sine dolore tamen notabili, at genu exinde petens, id acrius urget: artus jam habet æger ferè undequaque contractos & impeditos, ita aut claudicet, & permoleste prorepat. Urina illam colore imitatur, quæ in diabete excernitur; dorsum aliæque partes moleste pruriunt, maximè sub horam somni.

Post multos dirosque cruciatus, Paroxysmi subsequentes (naturâ partim onere materiæ peccantis, partim senio oppressâ) ægrum quoad dolorem clementius tractant; at, loco doloris consueti, ægritudo quædam cum dolore ventris, lassitudo spontanea, quandoque etiam propensio ad diarrhœam superveniunt; quæ symptomata evanescent, quoties articulos dolor fatigat: atque ita nunc dolore, nunc ægritudine, quasi alternatim laceffentibus, Paroxysmus longas moras neçtit.

Calculus Renum in quamplurimis parit hic affectus.

Fœminas perrarò infestat; easque, non nisi jam vetulas, & viragines; pueros quoque, & juvenibus minores, vix adoritur.

Indicatio

Indicatio Curativa in eo vertitur, ut cœctioni consulatur, indigestionibus sublatis, seu fit per Pharmaca, seu victûs rationem, seu exercitationem, seu alia ex istis quælibet, quæ sex res non-naturales indigitantur.

Venæsectio, Catharsis, ac Diaphoresis scopum non attingent; licet iis qui *Renum* simul *Calculo*, & exindè orto *Mictu sanguineo* laborant, non abs re erit, semel in septimanâ, alvum *Mannâ* subducere, & singulis noctibus, post purgationem *Paregoricum* exhibere.

Medicamenta, quæ prædictæ indicationi satisfaciunt, ea sunt, quæ moderatè calent, & vel amarificant, vel linguam leniter feriunt; talia sunt, *Rad. Angelic. Enula, fol. Absinth. Cent. min. Chamædr. Chamæp. &c.* quibus addi possunt *Antiscorbutica* dicta; ut, *Rad. Raph. rustic. fol. Coch. hort. Nasturt. aquat. &c.* quæ tamen parcius usurpanda veniunt, quia morbi fomiti aculeos subdunt, & calorem augent, præ istis aliis, quæ miti calore, atque amaritudine, ventriculum corroborant. Haud inutile est *Electuar.* sequens:

R. *Conserv. Coch. hort. fescunc. Absinth. Rom. flav. Aurant. ana unc. unam, Angel. condit. Nuc. moscb. cond. ana semunc. Theriac. Androm. drachm. tres,*

tres, pulv. Ari comp. drachm. duas, cum f. q. Syr. Aurant. Fiat Elect. de quo sumat drachm. duas bis in die, superbibendo seq. aq. distill. cochl. quinque vel sex :

R. Rad. Raph. Rust. incis. unc. tres; Coch. bor- tens. manipulos duodecim, Nasturt. aq. Becabung. Salv. Mentb. ana manipulos quatuor, Cort. Aur. N° sex, Nuc. mosch. condit. N° duo, Cerevis. Brunsvicens. libr. duodecim; distillantur organis communibus, donec solummodo libr. sex aquæ eliciantur pro usu.

Hæc autem remedia *digestiva*, constanter, atque omni adhibitâ diligentîâ, assiduè usurpanda, & in *Paroxysmorum* intervallis præcipuè in usum revocanda sunt.

Mediocritas ea in cibo observanda est, ut neque plus alimenti ingeratur, quàm ventriculus concoquere valeat; neque è contra nimiâ abstinentiâ, partes eâ proportionè alimenti defraudentur, quæ earundem robur & vigorem sustinere potis est. Quoad qualitatem autem ciborum, ægri palato consulendum est, & unica ciborum specie singulis partibus vescatur; de cæteris, demptâ carne, pro libitu comedat; modò nec acria, nec sale condita sint, nec aromatis. Prandere tantum expedit; loco autem cœnæ in-

dulgeat sibi haustum cerevisiæ alicujus tenuioris, quo calculi concretio impediatur.

Liquores optimi sunt, qui neque ad vini generositatem ascendunt, nec ad aquæ debilitatem, ne frigore suo lædant ventriculum, depriuntur. Hujusmodi est *Cerevisia tenuis Londinensis*, aut multa aqua cum paucò vino permixta; aqua autem pura & cruda periculosa est: cum autem universa ferè corporis substantia in podagram degeneraverit, à liquore quocunque fermentato, quantumvis leni & tenui, abstineat, & utatur *Decocto Dietetico ex Sarsa*, in remedium formulis descripto, ubi primum à paroxysmo convaluerit, per reliquum vitæ cursum.

Sin autem æger à longo & nimio liquorum inebriantium usu, vel ab ætate provecliore, vel denique præ nimia debilitate, cibos absque vino nèqueat concoquere; in pastibus haustum vini Hispanici sibi indulgeat, *Apozema Dieteticum* abdicans.

Æger maximè hyemis tempore, maturè lectum petat, diluculo exfurgat, animus sit tranquillus, nec nimis intentus studiis, & rebus seriis; cæteris verò omnibus, exercitatio corporis quotidiana facile palmam præripit, quæ moderata sit, & perseverans, nullo autem modo justo vehementior. Quoad exercitii genus, quoties
nec

nec grandior ætas, nec calculus intercedant, reliquis præferenda est equitatio constans, ac assidua in aëre salubri, aut vestio in curru.

Veneris lenociniis ne indulgeat: Remedia externa nulla adhibenda.

Quamvis nihil magni in paroxysmo tentandum sit, conducet tamen fortasse per aliquot dies, ubi primum à morbo corripitur, à carnibus abstinere, jusculo uti avenaceo, aut alio pari alimento; sin autem spiritus animales ataxiam concipere apti sunt, non expedit à carnibus abstinere diutius, quàm ventriculus earum usum aversetur: ne quid autem, vel in quantitate vel in qualitàte, ciborum aut potùs peccet.

Symptomatis iis occurrendum est, à quibus æger in paroxysmo de vita periclitatur: horum maximè familiare est, ventriculi languor, cum ventris torminibus, tanquam à flatu: hoc in casu, nihil æque votis respondet, ac Vini Canariensis haustulus subindè deglutitus; exercitio utatur æger: sin autem symptoma, inducias haud ferens, mortem minitetur, modo caput malum non impetat, ad *Laudanum* statim confugiendum, viz. gutt. viginti in haustulo aq. *Epidem.* & in lecto ad quietem se componat. [*Hâc ipsâ methodo, se ab imminente morte liberavit auctor clarissimus; ubi ex errore aliquo, circa res sex non-naturales, in ingentem ventriculi ægri-*

tudinem incidit, cum vomituritione, & aliquali ventris dolore; artus interim, ex retrocessione materiæ Podagricæ, dolores erant expertes, ac ad motum plus solito habiles. Congium nempe unum liquoris possetici, vel Cerevisiæ tenuis devorabat; & quamprimum totum per vomitum rejecerit, Vini Canar. haustulum, cui instillatæ fuerint Laud. liquid. gutt. octodecim sumebat.] Quod si huic remedio symptoma non cedat, sudor provocetur methodo & medicamentis huic usui dicatis, ad biduum triduumve, manè & vesperi, per duas tresve horas continuas.

Si autem metastasis fuerit materiæ peccantis in pulmonum lobos, liberatis artubus à dolore, & tumore, tractandum est hoc symptoma pari modo ac Peripneumonia absoluta; venæsectione scilicet repetitâ, diætâ, & remediis refrigerantibus, & incrassantibus; purgandus est insuper æger, inter venæsectiones, potionibus lenientibus: sudoris autem provocatio obest.

PHTHISIS seu TABIS

Descriptio & Cura.

PLures sunt Tabis species: PRIMA ferè oritur è frigore hyeme contracto. Paulo enim ante solstitium Brumale quamplurimi ab ingruente tempestate frigidâ, tussi tentantur. Quæ cùm illos invaserit quibus pulmones ab ortu sunt infirmiores, omnino necesse est, ut à repetitis Tussiendi conatibus magis adhuc debilitentur; atque ita tandem alimento sibi proprio assimilando, præ mala *διαίτην*, prorsus impares reddantur. Hinc jam ingens Pituitæ crudæ copia aggeritur, quæ continuâ Pulmonum agitatione & vehementi nisu affatim per os rejicitur. Pulmones exinde pure referti purulenta *μιάσματα* quaquaversum in carnes dispergunt. Hinc enascitur febris putrida, cujus Paroxysmus sub vespèram fatigat; sub auroram verò sudore copioso ac vires imminuente solvitur. Denique ad malorum cumulum Diarrhœa succedit, partim ab humoribus putridis ex arteriis mesentericis in intestina depositis excretisque, partim à labefactato pessundatoque viscerum

rum Tono. Atque ita demum æger proximam ætate fato suo fungitur, à morbo, cui prægressa hyems viam straverat, extinctus. Atque hæc est præcipua Tabis species.

Porro cum sanguis hac tempestate particulis humidis admodum scateat, perspiratioque à subita pororum contractione plus satis inhibeat, particulae hæ in pulmones depluunt per interspersos Venæ Arteriosæ ramos; vel per Ductus Salivales in glandulis fauces occupantibus reponuntur; unde jam humor per Asperam Arteriam delapsus in Pulmones, Catarrhi ritu, eos ita jugiter irritat, ut creber & vehemens tussiendo connatus, tum illam debilitatem, tum alia quæ diximus symptomata, brevi accersat. Cumque non jam amplius naturalem sibi pulmones economiam statumque tueri valeant, Glandulae & Tubercula adnasci solent; quæ in ægris ex hoc morbo decedentibus, si aspiciantur pulmones, purulentâ sanie, ut plurimum distenta reperiuntur.

Ubi semel invaluerit hic morbus, & radices egerit, remedia plerumque aspernatur. Tentari utcumque potest medicatio, minuendo causam defluxionis in pulmones, pertusâ in Cubito Venâ, Catharticis mitioribus; tum medicamentis pectoralibus dictis, ad varios morbi status

accommodatis ; incrassantibus scilicet, ubi humor subtilior & tenuior vim expultricis facultatis videtur eludere ; attenuantibus verò, ubi pituita crassior ægre, & cum molestia per os rejicitur. Dein & hæctica Febris remediis refrigerantibus contemperantibusque coercenda : talia sunt *Lac. Asininum*, *aqua lactis stillatitia* ; *Emulsiones ex Amygd. dulc. sem. Melon. Pepon. Papav. albi, aq. Fl. Paralyf. &c.* Denique & curando Ulceri opera danda est ; cui rei Terebinthina illa liquida, *Opobalsamum* vulgò dicta, apprime conferre censetur.

Hujusce morbi Curatio, me judice, hæc methodo optimè ac felicissimè instituetur. Primum educatur è brachio *sanguis* ; dein subducatur *Alvus* ad tres dies continuos, vel *Pil. Coch. majoribus*, vel *Decocto leniente à nobis præscripto*. Tertiâ nocte exhibeatur *Syrup. de Mecon. semunc.* Intermissio biduo triduove, pro re natâ repetatur Purgatio ; idque toties fiat, quoties opus esse videatur, donec symptomata vel prorsus evanuerint, vel saltem mitescant. Post singulas CatharSES jam finitas, capiat *Opobalsami gutt. viginti*, *Sacchari particule majori instillatas permixtasque*, nihil superbibendo ; vel *Pil. è Terebinth. ex insula Chio cum Saccharo cando confectam*. *Opobalsamum* non assumendum est, nisi prægressis

prægressis evacuationibus debitis. Hujus loco *Electuarium* è *Balsamo Lucatelli*, *Glycyrrhizæ pulvere*, *semine Anisi* & *Terebinthina concinnatum* poterit substitui. Post evacuationes sedulo conandum est, ut Tussis sedetur, ne pulmones jugi agitatione infirmiores evadant. Huc facit præcæteris Syrupus jam laudatus, qui hac formula possit usurpari :

R. *Decoct. pectoral. libr. unam*, *Syr. de Mecon. Syrup. Capill. Ven. ana unc. duas*. Capiat cochl. quinque ter in die. Medicamentum hoc ita frequenter haustum catarrhum in Pulmones depluentem paulatim sistet ; eosque in pristinam *ὑγιάν* reducet, nisi jampridem à naturali statu nimium recesserint. Promovebit insuper purulentæ materiæ in iisdem aggestæ concoctionem.

At verò *Palmarium* hujusce Morbi præsidium est, ut æger quotidie *equo vehatur*. Et qui se huic corporis exercitio sanandum tradit, nullis jam Diætæ legibus adstrictus, nullo cibi potusve genere privandus est : cùm in hoc unò omnis rei cardo vertatur. • Quibusdam eorum qui ex hac methodo convalere, tumor in collo exortus est, non multum à Scrophulis abludens.

Est & ALIA Tabis species à Tussi prognata, longè diverso anni tempore, initio scilicet æstatis. Hæc Juvenes persæpe illos invadit, qui debiliori sunt corporis habitu, & quorum sanguis particulis calidis acribusque refertus est. Sanguinem isti è pulmonibus per tussim exantlant, nimio meri potu priùs excalefacti. Ægri dolorem sive ægritudinem quandam in pulmonibus perſentiscunt: Quæ symptomata, nisi maturè remediis appropriatis eliminentur, primo scabrities, mox & ulcus accedit; unde pus confectum demum exspuitur.

Dicta jam Tabis species, Venæsectione & Catharsi bis alternatim repetitis, saltem in principio, facile vincetur: si Diætâ insuper refrigerante & incrassante utatur æger, & à carnibus in solidum abstineat.

TERTIA hujus Morbi species ortum debet materiæ Febrili in pulmones, Febre jam fatifcente, amandata; qui sensim infirmiores redditi à symptomatis jam memoratis vexantur.

Quandoque oritur à sanie istâ purulentâ, quæ à Pleuriticis non satis copiosè per expectorationem egeritur. Quo in casu eandem, quàm Empyema, curationem postulat.

Q

Sunt

Sunt etiam qui à nimis copiosis, & debito frequentioribus evacuationibus debilitati in QUARTAM Tabis speciem præcipitantur. Hos calor Hecticus à cibo potuque sumpto, sub noctem laceffit : atque hos præ cæteris Aphthæ infestant.

F I N I S.



I N D E X.

A Bortus præcaven-	
dus	Pag. 71
Ambusta	97
Angina	33
Apoplexia	50
Asthma	102

C	
Chlorosis	94
Cholera Morbus	62
Chorea Sancti Viti	48
Colica biliosa	60
Hysterica	68
Pictonum	64
Contusiones	99

D	
Diabetes	86
Diarrhœa	57
Dysenteria	<i>ibid.</i>

E	
Epilepsia Puerorum	88

F	
Febr. Constitutionum	
variarum	23
a Dentitione	
ortæ	91
Depuratoria	13
Erysipelatosa	31
Hæctica Infan-	
tum	92
Intermittens	17
Pestilentialis	15
Scarlatina	24
Statitionaria	20
Fluor albus	84
Furfur, five Porrigo	
Capitis	99

G	
Gonorrhœa viru-	
lenta	78

H	
Hæmoptœ	95
Hæ-	

I N D E X.

<p>Hæmorrhagia Na- rium 93</p> <p>Hæmorrhoidum Do- lor 87</p> <p>Fluxus immo- dicus 88</p> <p>Hydrops 74</p> <p>Hypochondriaca af- fectio 5</p> <p>Hysterica Passio <i>ibid.</i></p> <p style="text-align: center;">I</p> <p>Icterus 70</p> <p>Illiaci Passio 64</p> <p style="text-align: center;">L</p> <p>Lochiorum Fluxus immodicus 71</p> <p>Suppressio 73</p> <p>Lues venerea 82</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p>Mania communis 97</p> <p>Mensium fluxus im- modicus 66</p> <p>Suppressio 95</p> <p>Mictus Sanguis à Re- num calculo 55</p> <p>Morbilli 35</p> <p style="text-align: center;">N</p> <p>Nephriticus Paroxyf- mus 54</p>	<p style="text-align: center;">O</p> <p>Ophthalmia 53</p> <p style="text-align: center;">P</p> <p>Paralyfis 103</p> <p>Peripneumonia no- tha 27</p> <p>Phthisis 104 & 117</p> <p>Pleuritis 25</p> <p>Pruritus serinus 32</p> <p>Punctura tendinis 97</p> <p>Podagra 108</p> <p style="text-align: center;">R</p> <p>Rabies canina 100</p> <p>Rachitis 90</p> <p>Rheumatismus 28</p> <p>Remediorum formu- læ 1</p> <p style="text-align: center;">S</p> <p>Scorbutus 106</p> <p style="text-align: center;">T</p> <p>Tenesmus 57</p> <p>Tussis 104</p> <p>Tussis Puerorum con- vulsiva 92</p> <p style="text-align: center;">V</p> <p>Variolæ 38</p> <p>Ulcus Vesicæ 100</p> <p>Vomitus sanguinis 95</p> <p>Uteri procidentia 54</p>
--	--

